





ALCONE

9 A. 42.
BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadie

XXXX



Palchetto

Num.º d'ordine

10

NAZIONALE

B. Prov.

R. BIBLIOTECA

VITT. EM. III

NA





B. Brav.

II

14



609085

ENTRETIENS MATHÉMATIQUES

S U R
LES NOMBRES;
L'ALGÈBRE,

LA GÉOMÉTRIE, LA TRIGONOMÉTRIE
rectiligne, l'Optique, la Propagation de
la Lumière, les Télescopes, les Microscop-
pes, les Miroirs, l'Ombre & la Perspective.

Par le R. P. REGNAULT de la
Compagnie de JESUS.

TOME TROISIÈME.




A PARIS,

Chez { CLOUSIER,
DAVID, Fils, } Rue S. Jacques.
DURAND,
DAMONNEVILLE, Quay des Augustins.

M. DCC. XLIII.

Avec Approbation & Privilège du Roy.





T A B L E

D E S

ENTRETIENS MATHÉMATIQUES

Contenus dans le troisième Tome.

SUR L'OPTIQUE.

I. ENTRETIEN. Sur la Propagation de la Lumière. page 1

II. ENTRETIEN. Sur les Réfractions en général. 36

III. ENTRETIEN. Sur la Réfraction dans les Surfaces planes, ou sphériques. 49

IV. ENTRETIEN. Sur la Réfraction dans les Verres plan-convexes. 59



iv T A B L E

V. ENTRETIEN. <i>Sur la Réfraction dans les Verres convexes des deux côtés.</i>	page 67
VI. ENTRETIEN. <i>Sur la Vision.</i>	80
VII. ENTRETIEN. <i>Sur les Téléscopes.</i>	104
VIII. ENTRETIEN. <i>Sur les Microscopes.</i>	123
IX. ENTRETIEN. <i>Sur la différence des grandeurs apparentes dans les distances ou les situations différentes.</i>	133
X. ENTRETIEN. <i>Sur les illusions de la vue par rapport aux figures.</i>	152
XI. ENTRETIEN. <i>Sur les illusions de la vue par rapport au mouvement des corps.</i>	169
XII. ENTRETIEN. <i>Sur les propriétés de la vue considérée dans les deux yeux.</i>	177
XIII. ENTRETIEN. <i>Sur les Miroirs plans.</i>	188
XIV. ENTRETIEN. <i>Sur les Miroirs sphériques convexes.</i>	216

DES ENTRETIENS. v

XV. ENTRETIEN. *Sur les Miroirs
sphériques concaves.* page 225

XVI. ENTRETIEN. *Sur l'Ombre.*

239

XVII. ENTRETIEN. *Sur la Pers-
pective en général.* 261

XVIII. ENTRETIEN. *Sur l'Icno-
graphie.* 269

XIX. ENTRETIEN. *Sur la Scéno-
graphie.* 281

XX. ENTRETIEN. *Sur les projec-
tions informes.* 295

Fin de la Table.



ERRATA

Du troisième Tome.

Page 30. ligne 3. décrits, lisez, droits.

Page 121. ligne 21. Telescope astronomique, lisez, Telescope terrestre en astronomique.

Page 154. en marge, N. 116. lisez, N. 161.

Page 211. Prop. XVI. ligne 7. DF, lisez, DB.

Page 220. ligne 13. AB, lisez, AD.

Page 221. ligne 19 effacés C, & mettez à la place, du miroir.

Page 280. ligne 13. b, g, c, e, lisez, B, G, C, E.



ENTRETIENS
MATHÉMATIQUES
SUR

L'OPTIQUE.

I. ENTRETIEN

Sur la Propagation de la Lumière.

EUDOXE.  OIL A donc encore , Ariste , une espèce de décoration nouvelle dans votre Cabinet. Il y a quelque temps , c'étoit la Géométrie ou la Trigonométrie en figures parlantes , pour ainsi dire : aujourd'hui , c'est l'Optique , ce semble.

Tome III.

A

ARISTE. Comme l'Optique a beaucoup d'agréments , du moins pour moi ; j'ai fait faire par une main assez habile , un certain nombre de figures qui retracent tout d'un coup dans mon esprit ce qui me touche le plus dans cette partie des Mathématiques.

EUDOXE. Refuseriez-vous de rappeler dans mon esprit les idées que ces figures réveillent dans le vôtre ?

ARISTE. C'est-à-dire, Eudoxe, que toujours attentif à faire le plaisir des autres, vous aimez à vous entretenir avec eux des choses qui vous paroissent les intéresser le plus. Hé bien, puisque vous le voulez, à la Lumière du Calcul, de la Géométrie, & de la Trigonométrie, nous développerons nos idées sur l'Optique, à peu près comme nous avons fait sur le Calcul, la Géométrie & la Trigonométrie même. Les véri-

tés connues, les Définitions, les Propositions démontrées prépareront la résolution des Problèmes; & en allant encore par degrés, pas à pas, lentement, peut-être en avancerons-nous davantage.

EUDOXE. Allez, Ariste, le train qu'il vous plaira: vous me verrez toujours constant & fidèle à vous suivre sans déranger le fil des choses que vous direz.

I. ARISTE. D'abord, qu'est-ce que le mouvement d'un corps? Le passage d'un endroit dans un autre. La longueur du chemin parcouru dans un certain temps exprime la vitesse du corps en mouvement; & le produit de la vitesse par la masse, ou de la masse par la vitesse, la force: car la force d'un corps lui vient de sa vitesse; & comme chaque partie va aussi vite-que le corps, sa vitesse prise autant de fois qu'il a de parties, fait sa force.

4 I. ENTRETIEN

2. La Lumière est un corps en mouvement, puisque son action se fait sentir jusqu'à blesser les yeux.

3. La Lumière traverse le Cristal même : donc elle consiste en filets très-déliés de la matière céleste ou étherée, agitée par l'action du corps lumineux.

4. Les rayons sont des filets de lumière étendus depuis le corps lumineux jusques à nos yeux, où ils portent l'impression de ce corps : car un corps n'agit sur un corps éloigné que par le moyen d'un corps intermédiaire.

5. On appelle rayons simples ceux qui ne sont pas composés de plusieurs ; rayons solides, ceux qui sont composés.

6. Les rayons directs sont des rayons qui n'ont été détournés par la rencontre d'aucun corps.

7. Les rayons rompus sont des rayons qui ont été détournés dans

Le passage d'un milieu dans un autre, de l'Air, par exemple, dans l'Eau.

8. Les rayons réfléchis sont des rayons détournés sans passer d'un milieu dans un autre.

9. Tous ces rayons sont du ressort de l'Optique, mais en particulier les rayons directs, dont il s'agit ici.

Cela posé ;

PROPOSITION I.

10. *Le rayon porte la Lumière en ligne droite, sans la répandre également en tous sens.*

Soient deux tuyaux AB & CD, Fig. IV. qui se coupent à angles droits.

Je mets une Bougie allumée vis-à-vis une extrémité A du premier; vous voyez la Lumière par l'extrémité opposée B: mais regardez par un bout C du second; vous n'appercevez point la Lu-

A iij

6 I. ENTRETEN:
mière : donc , &c. (a).

PROPOSITION II.

11. *La Lumière a sa force.*

C'est une matière en mouvement , qui touche & frappe jusqu'à
• N 2 blesser les yeux*.

PROPOSITION III.

12. *La force de la Lumière répond au nombre des rayons solides qui la composent.*

Ces rayons ont sensiblement même grosseur, même longueur, même vitesse : ainsi, la force de la Lumière étant le produit des

(a) La Lumière du Soleil n'empêche pas que l'action des rayons des Etoiles ne vienne jusques à nos yeux : car au fond d'un Puits, ou avec un long tuyau , sur la surface même de la Terre , on voit les Etoiles en plein jour.

Alors la vivacité des rayons obliques du Soleil , affoiblie ou anéantie par un grand nombre de réflexions dans le Puits ou dans le tuyau , ne rend plus insensible l'action des rayons des Etoiles.

mêmes rayons par la même vitesse *, est plus ou moins grande * N. 1.
à proportion que les rayons sont plus ou moins nombreux.

PROPOSITION IV.

13. *La Lumière s'affoiblit à mesure que l'espace éclairé croît.*

La Lumière * est un mouvement qui se communique & par conséquent s'affoiblit à proportion que l'espace qui le partage, devient plus grand. * N. 2.

Par une raison contraire, la Lumière doit croître à proportion que l'espace éclairé par les mêmes rayons diminuera.

PROPOSITION V.

14. *Les diminutions de la Lumière Fig. 21.
qui se répand en rayons divergents
EB, EA, dans un milieu libre &
uniforme, sont en raison doublée des*

A.iii.j.

8 I. ENTRETIEN

distances au point lumineux d'où elle part.

Je dis donc que la diminution de la Lumière en F est à la diminution de la Lumière en G, en raison doublée de la distance FE à la distance GE.

La diminution en F est à la diminution en G, comme la surface AFB est à la surface CGD *, puisque la Lumière s'affoiblit à proportion que l'espace éclairé croît. Or la surface AFB est à la surface CGD en raison doublée de la distance FE à la distance GE: car les surfaces des Sphères sont en raison doublée des rayons (a) ou des distances au centre de la Sphère.

15. De-là, les décroissèmens de la Lumière qui s'éloigne de sa source, sont comme les quarrés des distances, puisque les quarrés

(a) Géométrie, N. 401.

des distances en expriment la raison doublée (*a*).

PROPOSITION. VI.

16. *Les divers degrés de forces dans la Lumière qui s'éloigne de sa source, sont en raison inverse des quarrés des distances.*

Je dis que la force de la Lu-^{Fig. 2.}mière en G est à la force en F, comme le quarré de FE est au quarré de GE.

La force en G surpasse la force en F, à proportion que la surface ou la couche AFB excède la surface ou la couche CGD*.

*N. 13.

Ainsi, la force en G est à la for-^{14.}ce en F comme la surface AFB est à la surface CGD: or la surface AFB est à la surface CGD, comme le quarré de FE est au quarré de GE (*b*). Donc la force de la Lumière en G est à la force:

(a) Calcul Littéral, N. 182.

(b) Géométrie, N. 401.

10 I. ENTRETEN

de la Lumière en E, comme le quarré de FE est au quarré de GE.

17. De-là, 1°. Les forces de la Lumière sont réciproquement comme les surfaces où elles se trouvent.

18. 2°. Si les quarrés des distances au point lumineux sont 1, 4, les degrés de la Lumière seront 4, 1; la distance FE est-elle double de GE? La force de la Lumière en G sera quadruple. Si $FE = 3GE$, la force en G sera noncuple, &c. & par conséquent la force de la Lumière diminue selon la progression $1. \frac{1}{4}. \frac{1}{9}. \frac{1}{16}. \frac{1}{25}$, &c.

Fig. 2. 19. 3°. Par une raison contraire, si la Lumière se répand en rayons convergents BE, AE, les forces de la Lumière croîtront dans la raison inverse des quarrés des distances au point de réunion E, ou des rayons FE, GE:

Je dis que la force de la Lumière

en F sera à la force en G, comme le quarré de GE au quarré de FE.

La force en F sera à la force en G comme la surface CGD à la surface AFB *. or la surface CGD *N.17, est à la surface AFB comme le quarré de GE au quarré de FE (a).

20. EUDOXE. Ainsi, les forces de la Lumière du Soleil sur la Terre, & sur la Lune placée entre la Terre & le Soleil, seront en raison renversée des quarrés des distances de la Terre & de la Lune au Soleil; c'est-à-dire, que la force sur la Lune sera à la force sur la Terre, comme le quarré de la distance de la Terre au Soleil est au quarré de la distance de la Lune à cet Astre.

ARISTE. En général, plus les corps seront éloignés du corps lumineux, moins ils seront éclairés; & les diminutions de clarté, le reste égal, seront comme les

(a) Géométrie, N. 401.

quarrés des distances.

21. EUDOXE. Mais, *Ariste*, il faut les trouver, ces diminutions de forces dans la Lumière.

Fig. 3. *ARISTE*. Hé bien, soit le corps lumineux B, produisant en C un certain degré de Lumière.

D'abord, je prends les espaces BC, CD, DE, EF égaux.

Ainsi, la distance BD sera double de BC ; BE, triple ; BF, quadruple.

Puis, je suppose que la Lumière en C est 1. Et je dis que la Lumière étant 1 en C à la fin du premier intervalle, elle sera $\frac{1}{4}$ en D, à la fin du second ; $\frac{1}{9}$, en E ; $\frac{1}{16}$ en F, &c.

1°. Puisque la distance BD est double de BC = 1, le quarré de BC est au quarré de BD comme 1 à 4 (a) : donc la Lumière en C est à la Lumière en D, comme 4 à 1 * : & par conséquent la Lu-

(a) Calcul Littéral, - N. 12.

nière en C étant 1, la Lumière en D sera $\frac{1}{4}$.

2°. Puisque $BE = 3BC$, le quarré de $BC = 1$ est au quarré de BE , comme 1 à 9 : donc la Lumière en C doit être à la Lumière en E comme 9 à 1 * : donc la Lumière en E sera $\frac{1}{9}$.

Enfin, $BF = 4BC$: donc $BC^2 : BF^2 :: 1. 16$: donc il faut que la Lumière en C soit à la Lumière en F, comme 16 à 1 * : donc la Lumière en F sera $\frac{1}{16}$.

Ainsi, la Lumière étant 1 en C, à la fin du premier intervalle, elle sera successivement $\frac{1}{4}$ en D, $\frac{1}{9}$ en E, $\frac{1}{16}$ en F, &c. (a).

(a) L'air diminue la force de la Lumière : car si l'on introduit la Lumière dans une chambre obscure, par un petit trou, l'œil placé à côté du trou voit une trace lumineuse; sans doute, parce que l'air réfléchit quelques particules du rayon lumineux; ce qui doit l'affoiblir. Ainsi, l'on a raison de croire qu'aucun rayon ne porte la Lumière à une distance infinie.

EUDOXE. Mais enfin, la Lumière qui décroît de la sorte, rencontre des corps dans sa propagation, & les frappe tantôt perpendiculairement, tantôt obliquement : le rayon oblique ou perpendiculaire éclaire-t-il également ?

ARISTE. Non.

PROPOSITION. VII.

22. Un rayon solide moins oblique éclaire plus qu'un rayon plus oblique.

Fig. 4. Soit le Plan BF divisé en parties égales BC, CD, DE, EF :

Je dis que le rayon solide BAC éclaire plus BC, que le rayon CAD n'éclaire CD, ou que l'angle $BAC > CAD$, & contient par conséquent plus de rayons simples.

Du point A, intervalle AC, décrivez l'arc HCGIK ; & tirez AK parallèle à BF.

AB perpendiculaire sur BF,

SUR L'OPTIQUE. 15

est la hauteur commune des Triangles BCA , CDA , &c. (a).

Ainsi le Triangle $BCA = CDA$ de même base & de même hauteur (b) : donc le secteur $HCA > CGA$, de la valeur de $BCH + CGD$. Or les secteurs HCA , CGA sont comme leurs bases HC , CG (c) : donc l'arc $HC > CG$: donc l'angle $BAC > CAD$ (d), ayant plus grande mesure.

Par la même raison, l'angle $CAD > DAE$, &c.

23. De-là 1°. Le rayon EAF Fig. 4 le plus éloigné de la perpendiculaire AB , ou le plus incliné au Plan BF , éclaire le moins. 2°. Plus un rayon est oblique, moins il éclaire.

EUDOXE. Ainsi, moins le Soleil

(a) Géométrie, N. 188.

(b) Ibid.

(c) Ibid. N. 284.

(d) Ibid. N. 93.

16 II. ENTRETEN

fera élevé, moins il éclairera la Terre

Fig. 4. *ARISTE.* Le rayon FAE parti du point A du Soleil moins élevé, doit éclairer moins que le rayon EAD du Soleil plus élevé : car l'angle FAE $\angle$ EAD* : donc le rayon FAE contient moins de rayons simples que EAD, donc le rayon FAE ayant moins de for-

* N. 22. ces *, doit moins éclairer (a).

PROPOSITION VIII.

24. *Les rayons du Soleil reçus par un petit trou dans une Chambre obscure sur un Plan parallele au Plan*

(a) Pourquoi le Soleil est-il beaucoup plus chaud en Eté par rapport à nous ? Est-ce précisément parce que les rayons, étant moins obliques, sont plus réfléchis ? Non : mais parce qu'étant moins obliques, ils ont plus de forces, & les font sentir plus long-temps sur l'horison.

Et si les chaleurs sont si violentes vers le Pôle en Eté, malgré l'obliquité des rayons, c'est à cause de la continuité de l'action du Soleil sur l'horison.

apparent

apparent du Soleil, forment deux Cônes opposés au sommet.

1°. Les deux rayons GK, HI Fig. 54. partis de deux points opposés G, H du Soleil & croisés en B, font avec les bases GH, IK, deux Triangles GBH, IBK opposés au sommet B.

2°. Faites tourner ces deux Triangles sur l'axe commun CA : ils formeront deux Cônes qui auront pour bases GXHY, & INKM, & un sommet commun B. Or ces Triangles ne feront que ce que font les rayons partis de tous les points de la circonférence dont GH est diamètre.

PROPOSITION IX.

25. *Ces deux Cônes sont semblables.*

Les angles GCB, KAB sont Fig. 55. droits (a), & les angles CBG.

(a) Géométrie, N. 394.

Tome III.

B

ABK, opposés au sommet : donc l'angle $G = K$ (a).

Par la même raison, l'angle $H = I$: donc les Triangles GHB, KIB sont semblables (b) : donc les deux Cônes étant faits de Triangles semblables, sont semblables.

PROPOSITION X.

Fig. 5. 26. Dans le second cône IMKNB, les différents degrés de Lumière sont réciproquement comme les quarrés des distances au trou B.

Je dis que la Lumière en D est à la Lumière en A, comme AB^2 à DB^2 .

On peut regarder le trou B, comme un point d'où part la Lumière. Or les différents degrés de la Lumière qui s'éloigne de sa source, sont réciproquement comme les quarrés des distances au point d'où elle part *, ou dans la

(a) Géométrie, N. 136.

(b) Ibid. N. 133.

raison inverse de ces deux quarrés.

PROPOSITION XI.

27. *Les rayons du Soleil reçus par un petit trou B dans une Chambre obscure sur une muraille, ou sur un drap blanc parallele au Plan apparent du Soleil, y traceront l'image du Soleil même.*

Ils y traceront une base IMK-Fig. 5. NA semblable a la base GXHYC d'où ils sont partis; & qui est l'hémisphère apparent du Soleil: donc ils y traceront l'image de cet Astre.

PROPOSITION XII.

28. *Dans cette image, l'objet sera renversé.*

Ce qui est à gauche, ou en G, Fig. 5. sera peint à droite, ou en K dans l'image: ce qui est à droite, ou en H, sera peint à gauche, ou en I dans l'image*; donc dans cet-*N. 24.
Bij.

te image, l'objet sera renversé.

Fig. 6. *EUDOXE.* Aussi, que l'image de la flamme ABC d'une Bougie aille se peindre par un petit trou D sur une muraille, ou sur un carton blanc EFG placé à une certaine distance du trou; la flamme paroîtra renversée.

ARISTE. Le rayon AG portera en G, ou en bas l'image de la partie supérieure A de la flamme; le rayon CE portera en E, ou en haut, l'image de la partie inférieure C.

PROPOSITION XIII.

29. La hauteur de l'image qui vient par un petit trou se tracer sur un Plan parallèle à l'objet, est à la hauteur de l'objet, comme la distance de l'image au petit trou est à la distance de l'objet même à ce trou.

Fig. 6. Je dis que $EG : AC :: ED : DB$.

SUR L'OPTIQUE. 25

Les Triangles DBC & DFE,
DBA & DFG étant semblables*, *N. 25.
leurs côtés sont proportionnels (a),
donc EF. BC :: FD. DB :: FG.
AB. Donc EF + FG. BC +
AB :: FD. DB (b): mais, EF +
FG = EG, & BC + AB = AC :
donc EG. AC :: FD. DB.

De-là, si C est le Soleil, & A. Fig. 5.
son image ; le diamètre IK de
l'image du Soleil est au diamètre
GH du Soleil même, comme la
distance AB de l'image au trou B
est à la distance BC de l'Astre au
trou.

EUDOXE. Ici viennent s'offrir
deux ou trois Problèmes.

PROBLÈME I.

30. Recevoir la Lumière du So- Fig. 5.
leil par un petit trou B sur un Plan
A parallèle au Plan apparent de
l'Astre.

(a) Géométrie, N. 150.

(b) Calcul Littéral, N. 1453.

ARISTE. L'expérience apprend que si l'on reçoit les rayons d'un corps lumineux par un petit trou sur un plan oblique à l'axe AC de la Lumière, les rayons forment sur le Plan la figure d'un cercle allongé, & que les mêmes rayons reçus perpendiculairement tra-cent sensiblement un vrai cercle.

Cela posé; 1°. Je fais le trou B dans une lame fort mince, afin que les rayons y puissent se croiser.

2°. Je décris sur le Plan plusieurs cercles concentriques.

Si l'image tracée sur le Plan quadre avec un de ces cercles, ce sera un cercle sur le Plan: donc l'axe ou le rayon central AC sera perpendiculaire, & sur le Plan A, & sur le Plan apparent C du Soleil: or si une ligne est perpendiculaire sur deux Plans, les deux Plans sont parallèles (a): donc la

(a) Géométrie, N. 304.

Lumière sera reçue sur un Plan
parallele au Plan apparent du So-
leil.

PROBLÈME II.

31. EUDOXE. Connoissant le dia-
mètre de l'image du Soleil, reçue
par un petit trou sur un carton, pa-
rallele au Plan apparent du Soleil,
la distance du carton au trou, &
celle du trou au Soleil (a) ; trouver
le diamètre, la circonférence, le
grand cercle, la surface & la solidi-
té de cet Astre. Le Problème est
digne de vous.

ARISTE. 1°. Je dis : comme la Fig. 55.
distance AB de l'image A du So-
leil au trou B, est à la distance
BC du Soleil C au trou B, ainsi,
le diamètre IK de l'image est au
diamètre GH du Soleil * ; & le *N.29.
quatrième terme sera le diamètre
de cet Astre (b).

(b) Trigonométrie, N. 85.

(b) Calcul Littéral, N. 137.

24 I. ENTRETIEN

2°. La circonférence du Soleil est trois fois son diamètre, un peu plus (a) ; ainsi connoissant le diamètre, j'aurai la circonférence.

3°. Le produit de la demi-circonférence par le demi-diamètre vaut le grand cercle (b) : donc ce produit me donnera le grand cercle du Soleil.

4°. La surface d'une Sphère est quadruple du grand cercle (c) : par conséquent le produit du grand cercle du Soleil par 4, en fera la surface.

5°. Un Globe vaut le produit de son grand cercle par les deux tiers de son diamètre (d) : donc en multipliant le grand cercle du Soleil par les deux tiers de son diamètre, j'aurai dans le produit la

(a) Géométrie, N. 281.

(b) Ibid. N. 277.

(c) Ibid. N. 398.

(d) Ibid. N. 400.

Solidité de cet Astre.

PROBLÈME III.

32. *EUDOXE. Observer enfin les taches du Soleil par le moyen d'un rayon reçu par un petit trou.*

ARISTE. 1°. Je place vis-à-vis Fig. 5.
le trou B dans un endroit obscur,
un carton blanc A parallèlement
au Plan apparent du Soleil *, en- * N. 30.
sorte que l'image du Soleil soit ter-
miné exactement par un cercle.

2°. Si le carton est trop près du trou, l'image de l'Astre sera trop petite ; & les taches dont les images sont proportionnelles à celle de l'Astre, ne paroîtront point. Mais comme la base du Cône lumineux croît à mesure qu'il s'éloigne du sommet, je recule le carton, jusqu'à ce que la base du Cône soit une image assez grande pour présenter aux yeux des images sensibles des taches.

Continuerons nous de suivre le
Tome III. C

PROPOSITION XIV.

33. *Si le Plan éclairé est fort petit par rapport à la distance du point lumineux ; les rayons qui tombent sur le Plan , sont sensiblement parallèles.*

Fig. 7. Si la largeur AB d'un Plan éclairé est à la distance AC ou BC au point lumineux C qui l'éclaire, comme 1 à 2000000 , les rayons CA , CB tombent sur le Plan comme s'ils étoient parallèles.

L'angle B supposé droit , on trouvera le Sinus de l'angle C en disant : comme $AC = 2000000$ est à $AB = 1$, ainsi le Sinus total au Sinus C (a) : cet angle se trouve d'une seconde , environ. Ainsi les deux angles A , B , sont sensiblement droits (b) , & par conséquent les rayons AC & BC sont

(a) Trigonométrie , N. 61.
 (b) Géométrie , N. 122.

sensiblement paralleles (a).

PROPOSITION XV.

34. *Un Globe lumineux égal à un Globe opaque, en éclairera par des rayons paralleles la moitié précisément.*

Soient A, centre d'une Sphère lumineuse; B, centre d'une Sphère opaque égale à la Sphère A; CDEK, FGHI, deux grands cercles des Sphères, coupant les deux centres A & B; AB, ligne qui joint les deux centres; CE, FH, diamètres égaux, & perpendiculaires sur AB; CF, EH, lignes droites, tirées des extrémités C, E, d'un diamètre, sur les extrémités F, H, de l'autre. Fig. 8.

Je dis que la Sphère lumineuse A éclaire précisément la moitié de la Sphère B.

1°. Les lignes AC, BF, sont égales, étant rayons de cercles

(a) Géométrie, N. 44.

égaux ; & elles sont parallèles , puisqu'elles sont perpendiculaires sur AB , par la construction (a). Donc AB , CF , EH sont parallèles & perpendiculaires (b) : donc CF & EH sont Tangentes (c).

2°. Les Tangentes CF , EH ne touchent le cercle FGHI qu'en un point , chacune (d) : donc elles ne touchent point le demi-cercle FIH.

Or le cercle lumineux CDEK agit sur le cercle FGHI , suivant les Tangentes CF , EH , & parallèlement à ces Tangentes : donc il éclaire précisément le demi-cercle FGH.

Il faut en dire autant par la même raison des autres cercles , qui font les deux Sphères.

Donc la Sphère lumineuse A

(a) Géométrie , N. 44.

(b) Ibid. N. 41. 27.

(c) Ibid. N. 79.

(d) Ibid. N. 80.

éclaire précisément la moitié de la Sphère égale B.

PROPOSITION XVI.

35. *Si la Sphère lumineuse est plus grande que la Sphère opaque, la partie qui éclaire, est moindre que la moitié de la Sphère lumineuse, & la partie éclairée est plus grande que la moitié de la Sphère opaque.*

Soient A, centre de la Sphère lumineuse; B, centre de la Sphère opaque. Fig. 9.

Il suffit de prouver que l'arc CFH est plus petit que le demi-cercle KFL; & l'arc DGI, plus grand que le demi-cercle MGN: car CFH fera, en tournant, la partie qui éclaire; & DGI, la partie éclairée.

Je dis donc que $CFH < KFL$, & $DGI > MGN$.

D'abord le rayon CDE est Tangente commune, touchant les deux cercles sans les couper:

C iij.

donc les rayons AC, BD sont perpendiculaires sur CDE, & les angles ACE, BDE sont décrits (a).

Et puisque BD < AC dans l'hypothèse, la Tangente CDE & la ligne ABE qui passe par les deux centres A, B, étant convergentes, se rencontreront en E.

Cela supposé 1°. Comme les angles ACE, BDE sont droits, les angles CAE, DBE sont aigus (b), & le complément ABD est obtus (c): donc l'arc CF est moindre que le quart de cercle FK, & l'arc DG, plus grand que le quart MG.

2°. Par la même raison, FH < FL, & GI > GN.

Donc l'arc total CFH est moindre que le demi-cercle; & l'arc total DGI, plus grand que le demi-cercle.

(a) Géométrie, N. 79 & 95.

(b) Ibid. N. 121.

(c) Ibid. N. 97.

36. *EUDOXE*. Ainsi le Soleil étant plus grand que la Lune ou la Terre, il éclaire plus d'un Hémisphère, soit de la Lune; soit de la Terre; & par le même principe, si le Globe lumineux est plus petit que le Globe opaque, une partie DGI plus grande que la moitié MGN de celui-là éclaire une partie CFH plus petite que la moitié KFL de celui-ci. Fig. 2.

37. *Mais, Ariste, connoissant les demi-diamètres du Globe lumineux plus grand A, & du Globe opaque plus petit B, avec la distance AB des centres; il faut trouver la grandeur de la partie qui éclaire, & la grandeur de la partie éclairée.*

ARISTE. 1°. Je tire PB parallèle à CD. Comme BD & PC sont perpendiculaires sur CD, & par conséquent parallèles (a), entre deux parallèles PB, CD; $BD =$

(a) Géométrie, N. 44.

PC (a) : donc PA est la différence connue des rayons connus AC, & BD.

2°. BD, qui est perpendiculaire sur CD, l'étant de même sur PB parallèle à CD (b), DS sera quart de cercle (c); & par conséquent SG sera l'excès de la moitié de la partie éclairée au-dessus du quart de cercle.

3°. Connoissant dans le Triangle APB, rectangle en P, la différence PA, & la distance AB des centres A & B, je connois l'angle ABP (d), dont la mesure est l'arc SG; & connoissant DS + SG, je connois la moitié de la partie éclairée, & par conséquent la partie entière DGI.

Enfin, connoissant l'angle PBA, avec l'angle droit APB, je con-

(a) Géométrie, N. 40.

(b) Ibid. N. 46.

(c) Ibid. N. 93.

(d) Trigonométrie, N. 65.

ois l'angle PAB , qui a pour mesure l'arc CF ; & dès que l'on connoît la moitié CF de l'arc FH qui éclaire , on connoît l'arc entier.

EUDOXE. Et par là l'on trouve l'excès que le Soleil éclaire au dessus de l'Hémisphère dans la Lune & dans la Terre.

ARISTE. Si le Globe lumineux est le plus petit , on déterminera le même la grandeur de la partie qui éclaire , ou de la partie éclairée.

PROPOSITION XVII.

38. Si le Globe lumineux A qui Fig. 9.
est plus grand , est aussi plus proche , la partie éclairée DGI en est plus grande , & la partie CFH qui l'éclaire en est plus petite.

1°. Comme AB est à AP , ainsi le Sinus total est au Sinus de l'angle ABP ou de l'arc SG (a) : donc

(a) Trigonométrie , N. 60.

si la distance AB diminue, la différence AP demeurant la même, la raison du Sinus total au Sinus de l'arc SG diminue, & par conséquent le Sinus de l'arc SG croissant, l'arc SG croît; & puisque la différence SG de la moitié DSG de la partie éclairée au quart DS augmente, il faut que la partie éclairée DGI en soit plus grande.

2°. Mais tandis que l'arc SG, & par conséquent l'angle opposé $GBS = PBA$ croît, l'angle APB demeurant droit, l'angle CAF, & par conséquent l'arc CF diminue (a). Donc l'arc CFH, ou le segment qui éclaire, en est plus petit.

EUDOXE. Ainsi, dans la Pleine-Lune le segment de la Lune éclairé sera plus petit, la Lune étant plus éloignée; dans la Nouvelle-Lune le segment éclairé sera plus grand, mais

(a) Géométrie, N. 93.

urné vers le Soleil sans nous regarder.

ARISTE. Par la même raison ; un Globe lumineux plus petit B, et aussi plus proche, la partie qui est éclairée, en est plus grande ; & la partie éclairée, plus petite.

Enfin, les rayons de la Lumière qui s'éloigne de sa source & se répand sur les objets, se rompent souvent & se détournent dans le passage d'un milieu dans un autre, de l'eau, par exemple, dans l'air, ou du verre dans l'eau ; & c'est la réfraction de la Lumière (a). Voulez-vous, Eudoxe, que nous essayons au premier jour de suivre la Lumière jusques dans les routes les plus obliques ?

EUDOXE. Je vous accompagnerai volontiers, Ariste, jusques dans ces espèces de Labyrinthes.

(a) La connoissance des Réfractions, c'est la *Dioptrique*.

II. ENTRETEN.

Sur les Réfractions en général.

EUDOXE. **H**E bien, Ariste, nous allons donc suivre dans leurs détours des rayons infiniment déliés, & qui vont avec la rapidité même de l'éclair.

ARISTE. Ces rayons laisseront des traces de Lumière ou des points lumineux qui serviront à démêler leur action & leurs jeux divers dans les milieux différents.

Commençons par quelques observations fondées sur l'expérience, & par quelques Définitions pour s'expliquer plus nettement.

I.

Fig. 10. 39. La rayon HBI qui passe perpendiculairement d'un milieu.

ns un autre , de l'air , par exemple , dans l'eau , de l'eau dans l'air se rompt pas.

I I.

40. Mais le rayon AB qui passe obliquement d'un milieu plus rare dans un milieu plus dense , de l'air dans l'eau , ou de l'eau dans le verre , ou du verre dans le crystal ; au lieu de suivre la ligne droite ABK , se rompt dans le passage & décrit une ligne BG , plus proche de la perpendiculaire BI.

I I I.

41. Au contraire le rayon GB *Fig. 10.* qui passe obliquement d'un milieu plus dense dans un milieu plus rare , du crystal dans le verre , du verre dans l'eau ; au lieu de suivre la ligne droite GBL , se rompt en s'éloignant de la perpendiculaire BI , pour enfler une ligne plus

38 II. ENTRETEN.

approchant de la parallèle, ou de l'horizontale DBC (a).

DEFINITIONS.

Fig. 10. 42. *La ligne ou le rayon d'incidence AB*, est le rayon droit qui tombe sur la surface CBD qui doit le rompre.

43. *Le rayon rompu, ou la ligne de réfraction BG*, est le rayon considéré dans le milieu qui l'a rompu, & depuis le point B où il s'est rompu.

44. *Le point d'incidence ou de réfraction B*, est le point où le rayon d'incidence AB & le rayon rompu BG font un angle ABG.

(a) S'il arrive que dans le passage de l'eau froide dans l'eau bouillante, ou dans l'esprit de vin, plus rare, le rayon rompu ne laisse pas d'approcher de la perpendiculaire; c'est que la chaleur ayant chassé beaucoup d'air de l'esprit de vin, ou de l'eau chaude, le rayon y trouve un accès plus facile. Aussi la réfraction se trouve plus grande dans l'eau purgée d'air.

45. *Le Plan de réfraction* ABG est celui où se trouvent le rayon d'incidence AB & le rayon rompu BG.

46. J'appelle *surface réfractive* CBD celle où le rayon se rompt.

47. *L'axe d'incidence* est la perpendiculaire HB qui va du premier milieu couper la surface réfractive CBD au point de réfraction B ; *l'axe de réfraction* est la perpendiculaire IB qui va du second milieu couper la même surface au même point B. HB, ou IB peut être l'un ou l'autre également.

48. *L'angle d'inclinaison* ABH est l'angle fait par le rayon d'incidence AB avec l'axe d'incidence HB.

49. *L'angle d'incidence* ABD est l'angle fait par le rayon d'incidence AB & la surface réfringente CD. *L'angle de réfraction* KBG est l'angle fait par le rayon rom-

40 II. ENTRETEN

pu BG avec le prolongement direct BK du rayon d'incidence AB. L'angle rompu GBI est l'angle formé par le rayon rompu BG avec l'axe de réfraction IB.

§ 0. La réfraction en approchant de la perpendiculaire est celle où le rayon rompu BG se trouve plus près de l'axe de réfraction IB que le prolongement BK du rayon d'incidence AB. La réfraction en s'éloignant de la perpendiculaire est celle où le rayon rompu BA se trouve plus loin de l'axe de réfraction BH, que le prolongement BL du rayon d'incidence

N. 47. BG *.

§ 1. Enfin, le Foyer est le point où les rayons rompus se réunissent.

§ 2. EUDOXE. Mais, Ariste, comment trouvez-vous la valeur de l'angle d'inclinaison, de l'angle rompu, de l'angle de réfraction, de l'angle d'incidence?

ARISTE.

ARISTE. Soit un ais AE perpen- *Fig. 1.*
diculaire à un Plan BC , & oppo-
sé au Soleil D .

Si le rayon DG vient raser l'ais
 AE , l'ombre BC sera terminée en
 C par le rayon droit DC *. ** N. 103.*

Derrière cet ais AE ; je mets
un Cube de verre $ECFG$ aussi
haut que l'ais AE ; & l'ombre
se termine en H . Ainsi GH
est le rayon rompu; GC , le
prolongement direct du rayon
d'incidence DG : donc EGH
est l'angle rompu = LGI oppo-
sé au sommet; CGH , l'angle
de réfraction *, & $EGC = DGL$, ** N. 49.*
l'angle d'inclinaison *. ** N. 48.*

Cela posé; je mesure les lignes
 CE , HE sur une échelle bien di-
visée (a), & connoissant les côtés
 EG & CE du Triangle ECG rec-
tangle en E , avec les côtés EG ,
 HE , du Triangle rectangle EGH ,
je trouve l'angle d'inclinaison.

(a) Trigonométrie, N. 923.

42 II. ENTRETIEN

$EGC = DGL$ par la Trigonométrie (a), en disant $GE. EC ::$ Sinus total. Tangente; je trouve de même l'angle rompu EGH . Puis ôtant de l'angle d'inclinaison EGC , l'angle rompu EGH , j'ai dans le reste l'angle de réfraction $CGH = DGI$.

Enfin le complément de l'angle d'inclinaison $DGL = EGC$ sera l'angle d'incidence.

Au lieu d'un Cube de verre, on peut employer un Cube d'eau.

53. De-là, 1°. au passage du rayon de l'air dans le verre, la raison du Sinus CE de l'angle d'inclinaison $EGC = DGL$ au Sinus HE de l'angle rompu EGH est constamment la même, c'est-à-dire, comme 3 à 2 (b); ainsi le Sinus de l'angle rompu sera au Sinus de l'inclinaison, comme 2 à 3, & par conséquent plus l'inclinaison

(a) Trigonométrie, N. 66.

(b) Newton & Huguens l'ont trouvé tel.

son est grande, plus l'angle rompu est grand, puisque le Sinus de celle-là croissant, le Sinus de celui-ci croît.

54. 2°. L'angle d'inclinaison EGC qui comprend l'angle rompu EGH & l'angle de réfraction CGH, étant à l'angle rompu comme 3 à 2, l'angle rompu EGH est à l'angle de réfraction CGH, comme 2 à 1. Ainsi l'angle rompu est double de l'angle de réfraction.

55. 3°. Au passage de l'air dans l'eau, le Sinus de l'angle d'inclinaison est au Sinus de l'angle rompu, comme 4 à 3 (a) Ainsi, dans

(a) Au passage de l'air dans l'eau de pluie, Descartes a trouvé la raison du Sinus de l'inclinaison au Sinus de l'angle rompu, comme 250 à 187; c'est-à-dire, comme 4 à 3, à peu près.

Newton qui reconnoît différentes réfrangibilités dans les rayons, veut que les rapports des angles d'inclinaison, des angles rompus & des angles de réfraction trouvés par les autres, s'entendent des rayons moyens; comme les rayons verts; mais il trouve la diffé-

44 II. ENTRETEN-
ce passage l'angle rompu sera à
l'angle de réfraction , comme 3
à 1.

56. 4°. Si au passage de l'air
dans le verre, l'angle d'inclinaison
 $EGC = DGL$ est au-dessous de
20 degrés, l'angle de réfraction
 CGH fera la troisième partie de
l'inclinaison, ou à peu près: mais si
l'inclinaison est de 30 degrés,
l'angle de réfraction excède d'un
degré 31'' la troisième partie de
l'inclinaison; & l'excès croît dans
la suite.

Ainsi, tandis que l'angle d'in-
clinaison est au dessous de 20 dé-
grés, le rayon rompu s'approche
de l'axe, de la troisième partie, à
peu près, de l'angle d'inclinaison;
il en approche plus au-dessus de
30 degrés.

Cela posé;

rence si petite, que rarement elle paroît mé-
riter attention.

PROPOSITION I.

57. Si le rayon AB passe dans *Fig. 10.*
milieu plus dense, l'angle rompu
BI est moindre que l'angle d'incli-
son ABH.

Je dis donc que l'angle $GBI < ABH$.

L'angle $KBI = ABH$ opposé
sommet. Or l'angle $GBI < KBI$ *, puisque le rayon passant **N. 40.*
dans un milieu plus dense, au lieu
de suivre la ligne droite ABK,
s'approche de la perpendiculaire.

Donc l'angle $GBI < ABH$.

PROPOSITION II.

58. Si le rayon GB passe dans un
milieu moins dense; l'angle rompu
H est plus grand que l'angle d'in-
clinaison GBI.

Je dis donc que l'angle $ABH > HBI$.

L'angle $ABH > HBL$ *, puisque **N. 41.*
le rayon GB passant dans un
milieu moins dense, au lieu de

suivre la ligne droite GBL, s'écarte de la perpendiculaire HB vers A.

PROPOSITION III.

59. *Qu'un rayon entre dans un milieu par un point, ou qu'il en sorte par le même point, l'angle d'inclinaison dans le premier cas est angle rompu dans le second, comme l'angle d'inclinaison dans le second est angle rompu dans le premier.*

Fig. 10. Que l'angle ABH soit angle d'inclinaison dans le premier cas, & l'angle GBI, angle rompu: je dis que l'angle GBI supposé angle d'inclinaison dans le second cas, l'angle ABH fera l'angle rompu.

L'obstacle en B au prolongement direct BK ou BL étant le même, il détournera autant BA de BL, que BG de BK: donc l'angle de réfraction $ABL = GBK$. D'ailleurs l'angle $LBH =$

BI opposé au sommet : donc l'angle $ABH = KBI$ sera l'angle rompu.

EUDOXE. Aussi, que les rayons d'une Bougie allumée traversant le crystal tombent sur un endroit, après la réfraction : si l'on porte la bougie dans cet endroit, on voit les rayons réunis, après la réfraction, dans celui où la Bougie étoit d'abord.

60. *ARISTE.* Et par conséquent, Fig. 10. puisque dans le passage de l'air dans le verre, le Sinus $HA = KI$: l'angle d'inclinaison est au Sinus $HL = GI$ de l'angle rompu, comme 3 à 2 * ; & de l'air dans l'eau, comme 4 à 3 * : au passage du verre dans l'air, le Sinus GI : l'inclinaison sera au Sinus HA : l'angle rompu, comme 2 à 3 ; de l'eau dans l'air, comme 3

4.

D'ailleurs, comme le Sinus de l'angle GBI est double du Sinus

II. ENTRETIEU

de l'angle $GBK = ABL$, au passage du verre dans l'air le Sinus de l'inclinaison GBI sera double du Sinus de l'angle de réfraction ABL .

61. Enfin, connoissant un angle d'inclinaison & l'angle rompu correspondant; faut-il trouver la raison du Sinus d'un angle d'inclinaison quelconque à l'angle rompu, dans les réfractions au passage de l'air dans l'eau ou dans le verre, du verre ou de l'eau dans l'air?

Je fais une règle de trois, & je dis: comme le Sinus de l'inclinaison connue est au Sinus de l'angle rompu, correspondant & connu, ainsi le Sinus de l'inclinaison donnée à l'angle rompu qu'on cherche; & le quatrième

N^o 60. terme est cet angle rompu*: car au passage de l'air dans le verre, le Sinus de l'inclinaison est constamment comme 3 à 2; du verre dans l'air, comme 2 à 3; de l'air dans

lans l'eau , comme 4 à 3 ; de l'eau
dans l'air , comme 3 à 4.

Après cela ne pouvons-nous
point examiner les réfractions par-
ticulières des rayons dans les sur-
faces planes ?

EUDOXE. Je compte bien que
nous le ferons dès demain.

III. ENTRETIEN.

*Sur la Réfraction dans les Surfaces
planes , ou sphériques.*

EUDOXE. Vous voyez ces
traits divers , Eu-
doxe.

EUDOXE. Et je vois dans ces
traits, ce semble, les inflexions,
les directions, les mouvemens des
rayons rompus dans les différen-
tes Surfaces.

ARISTE. Et ce que ces traits ne
font que désigner, quelques Pro-

50 III. ENTRETEN
positions l'exprimeront un peu
plus distinctement.

PROPOSITION I.

Fig. 12. 62. Si deux rayons parallèles AD,
BE, tombent obliquement sur un Plan
réfractif LF, ils demeureront paral-
leles après la réfraction.

Je dis que les rayons rompus
DM & EC sont parallèles.

Les angles d'incidence ADE,
BEF sont égaux (a) ; & par con-
séquent les angles d'inclinaison
ADG, BEH, qui sont leurs com-
plémens : donc les Sinus AG,
BH, ont même raison aux Sinus
MI, CK, des angles rompus
N. 60. MDI, CEK : ainsi, les angles
MDI, CEK, ayant même raison
à deux grandeurs égales, sont
égaux (b) : donc les angles aigus
LDM, DEC, étant complé-
mens d'angles égaux, sont égaux :

(a) Géométrie, N. 104.

(b) Calcul Littéral, N. 106.

donc les rayons rompus DM & EC sont paralleles.

De-là, si l'on présente obliquement au Soleil un Verre plan de deux côtés, les rayons en sortent paralleles comme ils y sont entrés, & avec même inclinaison.

PROPOSITION II.

63. *Un rayon est perpendiculaire à une Surface courbe, quand il est perpendiculaire à un Plan tangent au point de réfraction.*

Si BC est perpendiculaire au Fig. 13.
Plan DE, qui touche la Surface courbe KCL au point C, je dis que BC est perpendiculaire à la Surface KCL, qu'il ne panche pas plus d'un côté que de l'autre, ou que l'angle mixte $KCH = LCI$.

Soit la Tangente $CI = CH$.

Les angles HCM, ICM, faits par la perpendiculaire continuée BCM étant droits, & par
E ij

52 III. ENTRETIEN

conséquent égaux (a), & les côtés CH, CM, & CI, CM, qui les comprennent, égaux; les Triangles CHM, CIM sont égaux (b): donc l'angle CMH = CMI, donc l'arc CK = CL*, donc le Secteur MCK = MCL(c): donc le Segment CKH = CLI; & par conséquent l'angle KCH = LCI.

64. De-là, un rayon perpendiculaire à la Surface d'une Sphère passe par le centre; & s'il passe par le centre, il est perpendiculaire à la Surface. Ainsi, il ne se rompt point*.


PROPOSITION III.


65. Un rayon qui tombe obliquement sur une Surface sphérique, convexe ou concave, se rompt, comme

(a) Géométrie, N. 95.

(b) Ibid. N. 136.

(c) Ibid. N. 284.





tomboit sur un Plan tangent au point d'incidence.

Comme la ligne circulaire est composée de lignes droites infiniment petites (a), la Surface sphérique est composée de Surfaces planes infiniment petites. Cela appposé; la Surface sphérique & le Plan tangent ont une partie commune infiniment petite. Or le rayon infiniment délié se rompt dans cette partie commune: donc il se rompt comme s'il tomboit sur un Plan tangent au point d'incidence.

PROPOSITION IV.

66. *Le rayon AB qui passe d'un milieu moins dense dans une Sphère parallèlement à l'axe CDF de la Sphère, le rencontre après une simple réfraction au-delà du centre E.* Fig. 14.

1°. Le demi-diamètre EB qui va du centre E au point de réfraction.

(a) Géométrie, N. 284.

54 III. ENTRETEN.

tion B, est perpendiculaire à la

*N.64. Surface GDH *: donc EBK est

*N.47. l'axe de réfraction *: donc le rayon parallele AB qui tend d'abord directement vers I, s'approchant, après la réfraction, de l'axe

*N.40. de réfraction EBK *, tend vers l'axe CDF de la Sphère, & le rencontre enfin.

2°. L'angle de réfraction FBI est plus petit que l'angle d'incli-

*N.48. naison $EBI = ABK$ *. Donc le

56. rayon rompu BF faisant avec l'axe de réfraction EB un angle FBE, doit rencontrer l'axe CDF de la Sphère au-delà du centre E, savoir en F, ou environ.

67. EUDOXE. Ici deux Problèmes viennent s'offrir, ce semble.

PROBLÈME I.

Connoissant la distance $BL = AC$ du point de réfraction B à l'axe CF d'une Sphère transparente, avec son

Fig. 14.

semi-diamètre $ED = EB$; trouver point F où le rayon AB qui vient du milieu plus rare parallèlement à l'axe CF , doit rencontrer l'axe même après une seule réfraction.

ARISTE. 1°. L'angle en L est droit, puisque BL , mesure de la distance, est supposée perpendiculaire sur CF (a). Ainsi connoissant les côtés BL & EB , je connoîtrai par la Trigonométrie (b) le côté EL & l'angle $LEB = EBI$ alterne $= ABK$ opposé au sommet & angle d'inclinaison *. *N.48.

2°. Comme je connois la raison du Sinus de l'angle d'inclinaison au Sinus de l'angle rompu, connoissant l'angle d'inclinaison ABK , j'aurai par une règle de trois le Sinus de l'angle rompu EBF *. *N.61.

3°. Connoissant les angles BLF , LBE , EBF , je connois & l'angle LBF composé des angles con-

(a) Géométrie, N. 34.

(b) Trigonométrie, N. 65.

56 III. ENTRETIEN.
nus LBE , EBF , & par conséquent l'angle BFL (a).

Enfin , connoissant les angles du Triangle FBL avec un côté BL, je connois le côté LF (b) , qui avec DL , reste du demi-diamètre connu ED, me donne le point de rencontre F.

PROBLÈME II.

Fig. 14. 68. EUDOXE. Trouver dans la même hypothèse , la distance FE du point de rencontre F au centre E.

ARISTE. De DF connue , j'ôte le demi-diamètre connu ED ; & le reste est la distance FE qu'il falloit trouver.

PROPOSITION V.

69. Le rayon qui tombe de l'air sur une Surface sphérique de Verre parallèlement à l'axe , doit rencontrer l'axe à la distance d'un diamètre :

(a) Géométrie , N. 122.

(b) Trigonométrie , N. 64.

& demi, si l'on n'a égard qu'à la réfraction qui se fait au passage de l'air dans le Verre.

Soient BC rayon d'incidence *Fig. 15.*
 parallele à l'axe MHF; BCD =
 ECG, angle d'inclinaison; FCG
 angle rompu, dont le Sinus est
 au Sinus de l'inclinaison comme
 2 à 3^{*}; enfin, ECF. angle de **N. 53.*
 réfraction, troisième partie de l'in-
 clinaison puisque l'angle FCG en
 comprend deux; BCF rayon rom-
 pu rencontrant l'axe en F; GH
 = CG, demi-diamètre de la Sur-
 face sphérique.

Je dis que $FH = \frac{1}{3}GH$.

Le Sinus de l'angle CF G
 = ECF alterne (a) est la moitié
 du Sinus de l'angle rompu FCG:
 or ces angles aigus sont comme
 leurs Sinus, ou à peu près (b); &
 leurs Sinus sont comme leurs cô-

(a) Géométrie, N. 101,

(b) Ibid. N. 88.

58 III. ENTRETEN
rés opposés (c) : donc $CG = GH$
fera moitié de GF : donc si l'on
ajoute GH à GF , la toute FH
fera triple du demi-diamètre CG
 $= GH$, ou $FH = 3 GH$.

Enfin, de la réfraction dans les
Surfaces planes ou sphériques,
mes idées me conduisent à la ré-
fraction dans les Verres plans -
convexes.

EUDOXE. Et je vous suis tou-
jours volontiers : mais quelque-
fois un peu de repos fait qu'on
avance plus.

(a) Trigonométrie, N. 61.



IV. ENTRETIEN.

*sur la Réfraction dans les Verres
plan-convexes.*

EUDOXE. **V**OUS comptiez
peut-être, Ariste,
sur un loisir de quelques Jours ;
& il faut dès aujourd'hui vous ex-
pliquer sur les Verres plan-con-
vexes.

ARISTE. Vous êtes toujours at-
tentif, Eudoxe, à me mettre sur
les choses qui me font quelque
plaisir. Expliquons-nous donc.

70. *Verre plan convexe*, est un
Verre dont une Surface est plane
& l'autre convexe.

71. *Lentille* est un Verre de fi-
gure lenticulaire. On imagine la
Lentille dans la Sphère dont elle
fait partie. La partie de l'axe to-
tal, laquelle traverse la Lentille,

en est l'axe; c'est la ligne qui mesure sa plus grande épaisseur. Le *Foyer* de la Lenticille est le point, où elle réunit les rayons. Le Verre plan-convexe est une sorte de Lenticille à cause de sa convéxité. Cela posé;

PROPOSITION I.

Fig. 16. 72. Dans un Verre plan-convexe ABC, l'arc CE compris entre l'axe FC & un rayon DEH parallèle à l'axe, est la mesure de l'angle d'inclinaison $GEH = DEF$.

Soit l'axe d'incidence GEF : ainsi GEH sera angle d'inclinaison*.

N. 48. son.

Et je dis que l'arc CE est mesure de l'angle GEH.

L'angle $GEH = DEF$ opposé au sommet; & l'angle $DEF = EFC$ alterne (a): or l'arc CE est mesure de l'angle au centre.

(a) Géométrie, N. 101.

EFC (b) : donc l'arc CE est mesure de l'angle GEH.

PROPOSITION II.

73. *Dans le Verre plan-convexe, le rayon qui tombe sur le Plan parallèlement à l'axe, va rencontrer l'axe après la réfraction.*

Soit BCD, Verre plan-convexe, ayant le Plan AD opposé directement au Soleil, ou à un autre objet lumineux; EC axe de la convexité prolongé en G; FB, rayon parallèle à l'axe & perpendiculaire sur AD. Fig. 174

Je dis que le rayon FB, rompu en B, rencontrera l'axe prolongé ECG.

1°. Le rayon FB, parallèle à l'axe perpendiculaire ECG, tombant perpendiculairement sur une Surface plane, passe sans se rompre jusqu'à la Surface convexe *. *N. 39;

2°. Mais FB passant enfin d'un

(a) Géométrie, N. 93.

82 IV. ENTRETEN

milieu plus dense dans un milieu plus rare, au lieu d'aller droit en K, s'éloigne de la perpendiculaire LBI *, faisant un angle GBK avec le prolongement direct BK, & s'approchant de l'axe ECG : donc FB va rencontrer ECG après la réfraction.

PROPOSITION III.

Fig. 17. 74. Dans le Verre plan-convexe, quand le rayon FB qui tombe sur le Plan parallèlement à l'axe ECG, rencontre l'axe, la distance GC du point de rencontre G à la Surface réfractive, est double du demi-diamètre CI de la convexité BCD, ou à peu près.

Je dis que $GC = 2CI$.

Au passage du Verre dans l'air, le Sinus de l'angle d'inclinaison $KBL = FBI$ est double du Sinus de l'angle de réfraction $KBG =$
 *N.60. BGC alterne *: donc le Sinus de l'angle rompu LBG , supplément

De l'obtus GBI, est au Sinus de l'angle BGC comme 3 à 1. Mais dans le Triangle obtus-angle BIG, le côté GCI est au côté BI=CI, comme le Sinus du supplément LBG au Sinus de l'angle BGC (a).

Donc GCI. CI :: 3. 1. Donc $GC = 2CI$.

75. De-là, 1°. Le point de rencontre, ou le Foyer G, se trouve à un diamètre de la Surface convexe BCD. Fig. 174

76. 2°. Un rayon parti du Foyer G & rompu en B par la Surface convexe de la demi-Lentille, sortira parallèlement à l'axe GCE : puisqu'il sera comme le rayon rompu, qui revenant sur ses pas reprend sa première direction*.

77. EUDOXE. Et par conséquent, si les rayons partis d'un point qui soit à la distance d'un diamètre de la Surface convexe opposée du Verre plan-convexe,

(a) Trigonométrie, N. 61, 63.

64 IV. ENTRETEN

viennent obliquement se rompre dans la Surface, ils seront parallèles à l'axe après la réfraction.

ARISTE. La conséquence me paroît juste.

PROPOSITION IV.

78. Dans le Verre plan-convexe, qui présente sa convexité à l'objet, au Soleil par exemple, les rayons parallèles à l'axe, vont rencontrer l'axe à l'extrémité du diamètre, ou environ, après deux réfractions, l'une en entrant, l'autre en sortant.

Fig. 18. Soient ECD Verre plan-convexe, dont la convexité EDO regarde le Soleil; FC+CL, rayon d'incidence prolongé, parallèle à NMP, parallèle à l'axe GK de la convexité; HCI, axe d'incidence ou de réfraction; FCI=HCL, angle d'inclinaison; KCL, angle de réfraction fait au passage C de l'air dans le Verre*; KMP=KCL, à cause

se

*N.49.

se de l'oblique CM coupant deux
parallèles (a); $QKM = KMP$ al-
terne (b) = CMN opposé au
sommet, & angle d'inclinaison
au passage M du Verre dans l'air;
 QMK , angle de réfraction; K,
point de rencontre à l'extrémité
du diamètre & demi DK, après
la réfraction au passage de l'air
dans le Verre*; Q, point de ren-^{*N.62.}
contre, après la réfraction au pas-
sage du Verre dans l'air:

Je dis que QD est le diamètre,
ou à peu près.

Au passage du Verre dans l'air,
le Sinus de l'inclinaison QKM
 $= KMP = CMN$, est double du
Sinus de la réfraction QMK .^{*N.60.}
donc dans le Triangle MQK, le
côté QM est double de QK (c).

Or $QM = QD$, il n'y a guères
de différence qu'une petite partie

(a) Géométrie, N. 104...

(b) Trigonométrie, N. 611.

(c) Ibid. N. 61...

de l'épaisseur de la Lentille. Donc $QD = 2 QK$: donc $KD = 3 QK$:

Mais KD ou DK vaut trois demi-diamètres, ou un diamètre & demi. Donc QD vaut deux demi-diamètres : donc QD est le diamètre, ou à peu près.

79. *EUDOXE*. En un mot, les rayons qui tombent parallèlement à l'axe sur la Surface convexe d'un Verre plan-convexe rencontreront l'axe à la distance d'un dia-

N.69. mètre & demi, par l'efficace de la première réfraction ; par la seconde réfraction, à la distance du diamètre, ou à peu près, comme il arrive lorsque les rayons tombent parallèlement sur le Plan* : mais, *Ariste*, si le Verre est convexe des deux côtés...

ARISTE. C'est le sujet d'un Entretien, & une occasion de vous revoir : car je ménage & multiplie ces occasions autant que je le puis.

V. ENTRETIEN.

Sur la Réfraction dans les Verres convexes des deux côtés.

EUDOXE. **V**ous sçavez, Aristote, de quoi il est question. Venons d'abord au fait.

ARISTE. Volontiers.

PROPOSITION I.

80. *Un Verre également convexe des deux côtés réunit les rayons, parallèles à l'axe, autour du centre de sa convexité.*

Soit BLDS, Verre convexe Fig. 19. également des deux côtés, & formé de deux segmens de Sphères égales.

Je dis que le point H, où le rayon EC parallèle à l'axe FG, rencontrera l'axe, après deux réfractions, est le centre de l'arc

Eijj

BLD, ou que HL est demi-diamètre, à peu près.

1°. Par la première réfraction seule au passage C de l'air dans le Verre, le rayon EC rencontreroit l'axe au point G, en sorte que
 N.69. GL seroit diamètre & demi.

2°. Regardons BKD comme une surface plane de la moitié BDL de la Lentille : l'angle d'inclinaison en K sera $CKN^* = MKG$ opposé au sommet ; & l'angle GKO, sera angle de réfraction, moitié de l'inclinaison* ;
 *N.78. OL, diamètre.

3°. Du centre F de l'arc BSD, je tire FKR : l'angle d'inclinaison
 *N.48. $GKR^* > MKG$ de la valeur de l'angle $MKR = NKF$, opposé au sommet, $= KFH$ alterne, $= FHK$ (a), les lignes HK & FK supposées partir des centres, étant égales, du moins sensiblement.

(a) Géométrie, N. 1366.

4°. A la sortie du verre, l'angle de réfraction est la moitié de l'inclinaison* : donc à cause de ^{* N. 60.} la convexité BSD, l'angle de réfraction doit croître au-dessus de la réfraction OKG qui seroit causée par la surface plane BKD, le la moitié de l'angle MKR = NKF opposé au sommet, = $\angle$ FH alterne, = FHK.

Donc l'angle de réfraction HCO qui doit être la moitié de l'inclinaison MKR = FHK*, sera ^{* N. 60.} la moitié de l'angle FHK : donc l'angle HOK sera aussi moitié de l'angle extérieur FHK (a), puisque l'angle extérieur FHK vaut les deux intérieurs HKO, HOK, donc le côté KH = HO.

Mais KH = HL, la différence, épaisseur même de la Lentille tant comptée pour rien : donc HL = HO.

Donc HO est demi-diamètre,

(a) Géométrie, N. 129.

70 V. ENTRETEN.

ou la moitié du diamètre LO, & par conséquent HL demi-diamètre.

81. EUDOXE. De-là, si les rayons viennent du centre ou du Foyer H, les rayons rompus seront parallèles à l'axe.

ARISTE. HC deviendra CE.

PROPOSITION II.

82. *Dans un Verre convexe des deux côtés, les rayons qui viennent de l'extrémité d'un diamètre, se réuniront à l'extrémité de l'autre.*

Fig. 20. Soit BCDIEH, Verre convexe des deux côtés; CG diamètre du Segment BCD; EF, diamètre du Segment HEI; F, Corps lumineux: je dis que les rayons FB, FD, partis de F se réuniront en G.

Dans les demi-Lentilles, ou dans les Verres plans-convexes, les rayons qui viennent de l'extrémité F ou G du diamètre, sortent

u Verre paralleles à l'axe *: donc * N.77;
 s sont paralleles dans la Len-
 lle : donc les rayons rompus
 H, DI qui sont paralleles dans la
 lentille, venant à sortir par la
 surface convexe HEI, se réuni-
 ont à l'extrémité du diamètre *: * N.74;
 donc les rayons FB, FD partis
 de F se réuniront en G.

83. EUDOXE. *Ainsi, les rayons
 partis de plus près, seront, ce sem-
 ble, plus divergents à la sortie de
 la Lentille.*

ARISTE. Les rayons ABHC, Fig. 211.
 & DIC qui viennent de l'extrémi-
 té A d'un diamètre AK, se réunif-
 ent à l'extrémité C de l'autre LC*. * N.82.
 Les rayons EBF, EDG, partis
 de l'extrémité E du demi-diamé-
 tre, sortent paralleles *: donc les * N.81.
 rayons partis de plus près seront
 plus divergents.

PROPOSITION IV.


84. Une Sphère entière exposée au Soleil, réunira les rayons hors d'elle-même à la distance de la quatrième partie du diamètre, ou à peu près.


Fig. 22. Soit ABCD Sphère de Verre; EI, axe de la Sphère, ou rayon passant par le centre F; DG, partie de l'axe égale à la quatrième partie du diamètre AD, ou à peu près.

Je dis que le rayon HB parallèle à l'axe EI rencontrera l'axe au point G; on suppose que HB n'est pas éloigné de l'axe EI.

1°. Par la première réfraction en B, le rayon parallèle HB rencontreroit l'axe en I, c'est-à-dire, à un diamètre & demi *.

2°. Que le rayon rompu BI coupe la circonférence en C: & par C tirez l'axe de réfraction FCK: l'angle $BCF = ICK$ opposé au sommet





Sommet sera angle d'inclinaison * : * N. 48.

GCI, angle de réfraction *, fera * N. 49.

moitié de l'angle ICK *, puis- * N. 60.

qu'au passage du Verre dans l'air, l'angle de réfraction est moitié de l'inclinaison.

3°. L'angle GIC est aussi moitié de ICK : car puisque $FD = DI$ *, & qu'une perpendiculaire * N. 69. CD, tirée de C à l'axe EI tombe sur D, ou presque sur D, il se fera deux Triangles égaux FCD, DCI (a) : Donc $FC = CI$, & l'angle $IFC = CIF$.

Or l'angle extérieur $ICK = IFC + CIF = 2IFC$ (b) : donc l'angle $GIC = \frac{1}{2} ICK$: donc l'angle GCI, moitié de l'angle ICK, est égal à GIC ; & le côté $GI = GC$ (c).

Mais $GD = GC$, à peu près ; donc $DG = GI$, à peu près : or

(a) Géométrie, N. 136.

(b) Ibid. N. 129.

(c) Trigonométrie, N. 61.

DI est demi-diamètre : donc DG, un peu moindre que GI, est un peu moindre que la moitié du demi-diamètre, ou que la quatrième partie du diamètre. Donc le rayon HB rencontrera l'axe hors de la Sphère en G, ou à la quatrième partie du diamètre, à peu près.

PROPOSITION V.

85. *Si un rayon tombe parallèlement à l'axe sur une Sphère plus petite, la réfraction sera plus grande que s'il tomboit de même sur une Sphère plus grande.*

Fig. 23. Soient B, point d'incidence dans une Sphère plus petite; M, point d'incidence dans une Sphère plus grande; AMB, rayon parallèle à l'axe CD: je dis que la réfraction sera plus grande en B, qu'en M.

ABK, angle d'inclinaison sur la Sphère plus petite *, vaut avec

l'angle ABD, deux droits (a).
 $\angle AMN = \angle BMD$, angle d'inclinaison sur la Sphère plus grande, ne vaut point deux droits avec l'angle ABD, puisqu'il faut y ajouter l'angle BDM (b): donc l'inclinaison sera plus grande en B, sur la Sphère plus petite. Or la réfraction répond à l'inclinaison, celle-ci étant la troisième partie de celle-ci au passage de l'air dans le verre *: donc la réfraction sera plus grande en B qu'en M. *N. 52.

86. EUDOXE. Il suit de-là, ce ne semble, que dans la Sphère plus petite, les rayons rompus en sortant, se réuniront à une moindre distance.

ARISTE. La réfraction IBK à l'entrée B étant plus grande *, l'inclinaison BCF = ICK à la sortie en est plus grande, puisque l'angle extérieur BCF = ICK vaut les intérieurs opposés IBK, Fig. 22.
*N. 85.

(a) Géométrie, N. 97.

(b) Ibid. N. 122.

BKC (a) : donc la seconde réfraction GCI en sera plus grande * :
 * N. 60. donc l'angle DCG en sera plus petit, & par conséquent le côté opposé DG, plus petit (b) : ainsi : le Foyer G sera plus proche de la Sphère (c).

PROPOSITION VI.

87. Enfin, tous les Verres convexes peignent au Foyer l'image de l'objet dans une situation renversée (d).

Fig. 24. Je dis que le point A, qui est à droite dans l'objet AG, doit paroître à gauche en B à la distance

(a) Géométrie, N. 125.

(b) Trigonométrie, N. 61.

(c) Le P. Dechalles prétend que les Lentilles Elliptiques ou Paraboliques, ne valent pas mieux que les Sphériques, & que ce que Descartes a dit là-dessus, & les Machines qu'il a décrites à ce sujet, sont bagatelles, Dupt. L. 1. p. 645.

(d) Le Foyer a quelque étendue, comme on le peut voir dans le cercle lumineux qui paroît au Foyer d'une Lentille présentée au Soleil.

du Foyer C, dans la base BC, tandis que le point G paroîtra en C.

1°. Quand le rayon AD fera rompu à l'entrée D, l'angle rompu EDF sera à l'angle d'inclinaison ADG comme 2 à 3 *: donc *N.53. le rayon rompu DE doit se trouver à gauche de l'axe GC du Verre convexe.

2°. Le rayon EB sorti du Verre dans l'air, s'éloignant de l'axe de réfraction KH *, continuera de *N.47. s'éloigner de l'axe GC.

3°. Les rayons partis du même point A de l'objet éloigné, venant parallèlement tomber sur le Verre convexe *, se réunissent autour du *N.33. Foyer après la seconde réfraction *: donc le rayon AI rencontrera le rayon AD en B.

Donc le point A paroîtra en B, tandis que le point G paroîtra en C, le rayon perpendiculaire n'étant détourné nulle part *. *N.39.

Par la même raison, ce qui est à gauche, ira se peindre à droite.

88. EUDOXE. *Aussi les objets paroissent renversés sur un Carton placé à la distance du Foyer.*

Fig. 25. ARISTE. Et si après la première image renversée AB par le premier Verre convexe EF, on place encore un Verre convexe GH, en sorte que l'image AB renversée par le premier, se trouve à l'extrémité de l'un des diamètres du second GH, l'image paroîtra à l'extrémité IK de l'autre diamètre du second *, dans une situation renversée *; c'est-à-dire, que l'image renversée par le premier Verre sera redressée par le second.

*N.82.

*N.87.

89. *Enfin, comme le Verre convexe rapproche de l'axe les rayons parallèles à l'axe, le Verre concave les en écarte.*

Fig. 26. Car le rayon AB parallèle à l'axe CD, tombant obliquement sur la Surface concave EBF se rompt

au passage B de l'air dans le Verre;
 & le rayon rompu BH s'étant rap-
 proché de la perpendiculaire GB
 +BC*, se rompt encore à la sortie *N.40.
 H du Verre dans l'air, pour sui-
 vre une direction HI qui l'éloigne
 de la perpendiculaire KD *. *N.41.

Or par ces deux réfractions,
 le rayon total ABHI s'écarte de
 l'axe CD.

EUDOXE. Je me trompe ;
 Aristé ; où ce que nous avons dit
 nous conduit à l'examen des cho-
 ses qui se passent dans nos yeux
 au moment de la Vision.

ARISTE. Aussi dans mon systé-
 me, c'est l'œil qui vient s'offrir
 d'abord, & la Vision doit être
 l'objet de notre premier Entre-
 tien.



VI. ENTRETEN.

Sur la Vision

EUDOXE. Vous allez donc, Ariste, démêler le jeu des rayons dans l'œil, & me faire voir ce qui se passe dans le fond de mes yeux, quand je vois.

ARISTE. Ce que l'expérience & la raison sembleront me dire la dessus, je le redirai dans le même ordre. La Physique pourra servir à éclairer les Mathématiques mêmes. Commençons par nous rappeler quelque chose de la structure de l'Œil.

L'Œil est une espèce de globe, un peu allongé, composé d'humeurs & de membranes.

90. Trois sortes d'humeurs dans l'Œil, l'Aqueuse, la Vitrée, la Crystalline.

L'humeur aqueuse A est une *Fig. 27.* matière fluide , comme l'eau , transparente , & qui remplit la partie antérieure de l'Œil.

L'humeur vitrée B , plus solide , plus abondante , & plus transparente , occupe la partie postérieure de l'Œil.

L'humeur crySTALLINE C , plus solide que la vitrée , & transparente comme le Crystal , est placée entre la vitrée & l'aqueuse , & les ligamens Ciliaires DD.

Le CrySTALLIN est assez convexe des deux côtés , sphérique par devant , un peu plus pointu par derrière.

La figure de l'humeur aqueuse est convexe par devant , concave par derrière pour s'accommoder à la figure du CrySTALLIN.

La figure de l'humeur vitrée est convexe par derrière , concave par devant pour contenir la partie postérieure du CrySTALLIN.

91. Autour des humeurs , on distingue plusieurs membranes , surtout la Cornée , la Choroïde , la Rétine.

La Cornée a deux parties , la postérieure EE est opaque & dure ; l'antérieure FF qui est figurée en portion de Sphère , est transparente comme de la Corne.

La partie antérieure HH de la Choroïde est l'Uvée. L'Uvée qui n'est point transparente , laisse une ouverture qui est la Prunelle. La Prunelle est au milieu d'un cercle qui s'appelle l'Iris. L'Iris nage dans l'humeur aqueuse.

La Rétine LL est un tissu velouté de petits filets très-déliés , qui sortent du Nerf optique M. Ce Nerf qui part du Cerveau , est une espèce de moëlle enfermée dans un canal : & qui s'épanouit en filets dans le fond de l'Œil.

Rappelons-nous encore quelques observations fondées sur l'expérience.

I.

92. Le même point d'un objet se voit de tous côtés : donc il envoie des rayons de toutes parts. Aussi les rayons dirigés par l'objet total vers l'Œil, font une sorte de Pinceau, de Cône, ou de Pyramide optique dont le sommet est dans l'Œil, & la base sur la Surface de l'objet.

II.

93. L'objet paroît à l'extrémité du rayon droit qui en porte l'impression dans l'Œil.

Allons maintenant de Propositions en Propositions, Eudoxe, & allant pas à pas, nous pourrions voir enfin ce qui se passe dans le fond de nos yeux.

PROPOSITION I.

94. Le rayon simple AB qui tombe perpendiculairement sur l'Oeil &c. Fig. 28.

84 VI. ENTRETEN.

les humeurs , ne se rompt point en les traversant.

Il ne trouve pas plus de résistance d'un côté que de l'autre ;
 N.39. rien qui le détourne : donc, &c.

95. Ce rayon perpendiculaire AB , est le rayon principal , l'*Axe optique* , ou l'*Axe de vision*.

Ainsi l'Axe optique ne se rompt point.

Fig.29. 96. De-là , l'Axe optique CD parti du côté gauche de l'objet , portera son impression sur le côté droit D de la Rétine ; & l'Axe optique BE parti du côté droit B de l'objet , portera son impression sur le côté gauche E de la Rétine..

PROPOSITION II.

Fig.28. 97. Les rayons obliques & simples AXH , AZH , qui composent avec l'Axe optique ABD un Cône ou un Pinceau , vont après s'être écartés , se réunir dans un point D de l'Axe optique.

1°. Les rayons AXH, AZH, qui viennent tomber obliquement sur la Surface convexe de l'humeur aqueuse, passant de l'air dans un milieu plus dense, s'approchent de la perpendiculaire H*.

*N.40.

2°. Passant obliquement de l'humeur aqueuse dans le CrySTALLIN, c'est-à-dire, dans un milieu plus dense, ils s'approchent encore de la perpendiculaire P*.

*N.40.

3°. Passant obliquement du CrySTALLIN dans l'humeur vitrée, c'est-à-dire, d'un milieu plus dense dans un milieu plus rare*, ils s'éloignent de la perpendiculaire N*.

*N.41.

Or ces rayons rapprochés d'abord de la perpendiculaire en H & P, puis éloignés en N, sont dirigés vers un point D de l'Axe optique : donc ils vont s'y réunir.

Aussi présentez à la lumière d'une Bougie la partie antérieure

86 VI. ENTRETIEN

du Cryftallin couverte d'un papier percé de deux trous : les rayons iront fe réunir derrière le Cryftallin (a).

PROPOSITION III.

98. *Les rayons se réunissent sur la Rétine.*

Otez à la partie postérieure d'un œil de Bœuf tué récemment, son enveloppe grossière, en sorte qu'on apperçoive l'humeur vitrée; mais sans endommager la membrane

Fig. 28. (a) Mais pourquoi le point A vu par le moyen de l'Axé optique ABD & des rayons obliques APD, ne paroît-il qu'en un endroit A, qu'à l'extrémité du rayon droit ABD, non en E, par exemple, ou le rayon oblique DPE aboutiroit? Le rayon droit ABD qui traverse les humeurs perpendiculairement & sans réfraction sensible* est plus fort; & la Rétine étant faite en voute, le point frappé B ne peut céder que suivant la direction perpendiculaire. Ainsi dans la voute HKI, la Pierre K frappée perpendiculairement suivant la direction LK, & obliquement selon la direction MK, ne peut céder que dans la direction perpendiculaire LK.

* N. 39.

qui l'environne : placez la Prunelle de l'œil vis-à-vis d'un trou qui donne accès à la lumière dans une Chambre obscure : vous voyez les objets extérieurs peints distinctement sur la Rétine : donc les rayons y portent les images des objets ; & par conséquent les rayons s'y réunissent.

EUDOXE. Enfin, selon les loix de l'union de l'Ame & du Corps, à l'occasion de l'impression portée par le Nerf optique, de la Rétine jusqu'au siège des fonctions de l'Esprit, l'Ame apperçoit les objets, & c'est la Vision (*a*) ; & il est

(*a*) Sous la Rétine & sur la Choroïde immédiatement, on observe une substance crasse & noire qui couvre la Choroïde : de-là, 1°. La Choroïde n'est propre à recevoir ni à faire passer au siège de l'Ame l'impression des rayons. Elle n'est donc pas proprement l'organe de la vûe.

2°. Comme la Rétine reçoit l'impression des rayons réunis, ou les images des objets*, *N. 98. lorsqu'elle sort en filets déliés du Nerf optique*, *N. 91. Elle est propre à faire passer cette impression

clair , ce semble , que si l'image qui occasionneimmédiatement la perception , est plus grande ou plus petite , l'objet paroîtra plus grand ou plus petit. N'est-ce pas là votre pensée , Ariste.

ARISTE. Oui.

PROPOSITION IV.

99. *Les images des objets sont renversées sur la Rétine.*

Fig.29. Le rayon BE parti de l'extrémité droite B de l'objet tombant perpendiculairement sur la partie droite du globe de l'Œil , doit s'en aller par le centre F aboutir au point opposé E dans le côté gauche de la Rétine. Le rayon CD parti de l'extrémité gauche C de l'objet doit aboutir par la même raison au point opposé D dans le côté droit , faisant avec le rayon

jusqu'au siège de l'Ame, où les Nerfs aboutissent ; & on la regarde comme l'organe de la vûe.

BE

des angles opposés au sommet.

Donc ce qui est à droite dans l'objet, est peint à gauche sur la Rétine ; & au contraire , ce qui est à gauche , est peint à droite. Donc les images des objets sont renversées sur la Rétine.

Aussi mettez devant la Prunelle de l'œil de Bœuf une Bougie allumée , & vous verrez la flamme renversée sur la Rétine.

EUDOXE. Le Crystallin fait en forme de Verre convexe, doit renverser l'image des objets* : mais **N. 84.* l'objet ne devoit-il point paroître dans la situation de l'image ?

ARISTE. Non..

PROPOSITION V.

100. Quoique les images des objets soient renversées dans le fond de l'œil, on doit voir les objets dans leur situation naturelle..

Je dis que la flamme ED, ren- *Fig. 39.*

Tome III..

H

verfée fur la Rétine, doit paroître dans fa situation naturelle BC.

Le rayon DC qui peint la pointe C de la flamme dans la partie inférieure D de la Rétine, paffant par le centre de l'œil aboutit extérieurement à la pointe même de la flamme. Le rayon EB qui peint la bafe B de la flamme dans la partie fupérieure E de la Rétine, aboutit extérieurement à la bafe

*N. 96. même * : or l'Ame rapporte naturellement à l'extrémité extérieure du rayon droit, ou de l'Axe optique, ce qu'il représente * : donc la pointe C & la bafe B de la flamme doivent paroître où elles font : donc la flamme ED renverfée fur la Rétine doit paroître dans fa situation naturelle BC.

Fig. 29. 101. De-là 1°. Deux objets B, C, dont les rayons tombent fur différentes parties E, D de la Rétine, paroîtront en des endroits différents.

Car par l'impression faite en E
 objet B paroîtra à l'extrémité de
 Axe optique EB; & par l'im-
 pression reçue en D, l'objet pa-
 roîtra à l'extrémité de l'Axe DC*: *N. 23. 1.
 r ces deux rayons qui se croisent
 en F, centre de la Rétine, vont
 aboutir nécessairement à des en-
 droits différents, faisant des an-
 gles opposés au sommet.

2°. S'il arrive que le même ob-
 jet envoie deux rayons perpendi-
 culaires sur deux points différens
 D, de la Rétine, il paroîtra en
 deux endroits: car il fera vû sui-
 vant la ligne droite EF + FB en
 B, & suivant la ligne DF + FC
 en C.






3°. Si les rayons partis du mê-
 me point de l'objet tombent sur
 divers points de la Rétine, l'objet
 paroîtra en divers endroits, &
 doublement: donc l'image sera
 confuse & foible.


4°. Si les rayons partis de divers

points se réunissent dans le même point de la Rétine, divers points de l'objet paroîtront au même endroit : donc l'image sera confuse.

Ainsi pour tracer sur la Rétine une image distincte, il faut, & que les rayons partis d'un point de l'objet se réunissent sur le même point de la Rétine, & que les rayons partis de divers points se réunissent sur des points différents.

102. On appelle *Angle optique*, ou de *Vision*, l'angle formé par les rayons principaux, ou par les Axes optiques, qui viennent des extrémités opposées de l'objet, & font, après s'être croisés dans la substance de l'œil, un angle opposé au sommet; & l'on nomme *Foyer* le point où les rayons se réunissent. La grandeur qui paroît sous l'Angle optique est l'*Objet apparent*.





PROPOSITION VI.

103. *Les objets vûs sous un angle plus grand paroîtront plus grands.*

Je dis que AC, vû sous l'angle *Fig. 31.*
 $ABC > DBE$, paroîtra plus grand que DE.

Puisque l'angle $ABC > DBE$, l'angle $FBG > HBI$ opposé de même au sommet: donc les côtés BF, BG, BH & BI qui sont rayons du même cercle, étant égaux, l'arc $FG > HI$: donc l'objet AC trace sur la Rétine une plus grande image que DE: donc AC paroîtra plus grand *.

* N 98.

Par la même raison, les objets vûs sous un angle plus petit, paroîtront plus petits; égaux sous le même angle.

104. Voulez-vous voir maintenant, Eudoxe, dans une sorte de Chambre obscure, ce qui se passe dans le fond de votre œil au moment de la vision?

94 VI. ENTRETEN

EUDOXE. Volontiers.

ARISTE. Je mets une Lentille dans un trou circulaire d'un doigt de diamètre, environ, fait dans une Fenêtre; & je reçois la Lumière sur un drap blanc étendu perpendiculairement vis-à-vis le trou.

Fig. 32. 1°. La Lentille IK réunit en M les rayons partis de L, ou en bas les rayons d'en haut; & en D les rayons de N, ou en haut les rayons d'en bas. De-là, l'image DM de l'objet NL est renversée: *N.96. sur le drap blanc*. Ainsi le Crystallin, qui est une sorte de Verre lenticulaire, porte & renverse les

N.98. images sur la Rétine.

Fig. 32. 105. 2°. Plus l'angle MRD =

LRN opposé au sommet & formé par les Axes optiques est grand, plus l'image MD sur le drap est grande, & plus l'objet paroît grand. Ainsi plus l'Angle optique ou de vision* sera grand, plus l'i-

*N.
102.

age sera grande sur la Rétine & l'objet paroîtra grand ; & les objets vûs sous le même angle paroîtront égaux.

106. 3°. Si le drap blanc est plus éloigné de la Lentille Z, l'image T de l'objet AB tracée sous le même angle sera plus grande : je dis que l'image en ST sera plus grande qu'en XY, parce que les axes optiques BYT, AXS aboutissent à des points plus écartés S, T. Ainsi plus la Rétine est éloignée du Crystallin, plus l'image tracée sur la Rétine sera grande, le reste égal.

107. 4°. Si le drap est plus près de la Lentille Z, l'image XY est plus petite, parce que les rayons ZX, BZY aboutissent à des points X, Y moins écartés que S, T. Ainsi plus la Rétine est proche du Crystallin, plus l'image sur la Rétine sera petite, le reste égal.

108. 5°. Si le drap CKL est

trop loin de la Lentille FG, l'image est foible & confuse, parce que les rayons ABL, ADK, AEC partis d'un point A de l'objet, ne tombent sur le drap CKL qu'éparpillés après leur réunion dans le Foyer H, & mêlés avec des rayons étrangers ou partis d'autres points. Ainsi la Rétine trop éloignée du CrySTALLIN ne recevra que des images foibles & confuses; à une juste distance, ou dans le Foyer, elle aura des images vives & distinctes.

Fig. 34. 109. 6°. Si le drap est trop près de la Lentille FG, l'image est foible & confuse, parce que les rayons tombent sur le drap II avant leur réunion dans le Foyer H, & qu'alors coupant des rayons qui viennent d'autres points, ils se trouvent mêlés avec des rayons étrangers.

Ainsi la Rétine trop voisine du CrySTALLIN ne recevra que des images

ges.

es foibles & confuses.

III. 7°. Si l'on couvre une par- *Fig. 34.*
e D de la Lentille FG, l'image
e l'objet entier ne laisse pas de se
eindre sur le drap, parce qu'il
a encore des rayons ABL,
EC, &c. de chaque point qui
ombent sur le drap : mais com-
me il y a moins de rayons effica-
es, l'image est plus foible. Ainsi
e Crystallin se trouvant couvert
n partie d'une espèce de Tave,
l'image de l'objet entier ne laissera
as de se graver sur la Rétine;
mais elle sera plus foible, faute de
ayons efficaces.

III. 8°. Enfin je couvre la *Fig. 35.*
lentille, en sorte que la lumière
entre que par deux endroits B,
C ; je dispose un Carton pour la
recevoir, & je présente une Bou-
gie en D : les rayons se réunissent
n E qui devient un point lumi-
eux. Je recule la Bougie & la
place en F ; & les rayons se réu-

98 VI. ENTRETIEN.

nissent en G, plus près de la Lentille, les rayons partis de plus loin étant moins divergents à la
 N^o 3 sortie de la Lentille : ainsi le même CrySTALLIN réunit plus loin de lui les rayons qui viennent de plus près ; plus près, ceux qui viennent de plus loin. De-là, si l'image des objets vûs de près est distincte, l'image des objets vûs de loin sera confuse, parce que les rayons venus de loin se réuniront avant que de tomber sur la Rétine. Si l'image des objets vûs de loin est distincte, l'image des objets vûs de près sera confuse, parce que les rayons venus de près, ne se réuniront qu'au delà de la Rétine.

EUDOXE. *Vous trouverez encore, ce me semble, dans ce que nous avons dit, ce qui fait la différence des vûes longues & des vûes courtes.*

112. ARISTE. J'appelle vûes

ongues celles qui voyent distinctement les objets éloignés , & confusément les objets voisins. C'est le défaut ordinaire des Vieillards. Ainsi comme l'apparence de l'objet répond à l'image tracée sur la Rétine *, il faut que dans *N. 95. les vûes longues , les images des objets éloignés soient distinctes sur la Rétine , & que les images des objets voisins y soient confuses.

113. Les vûes courtes sont celles qui voient distinctement les objets qui sont proches , & confusément ceux qui sont éloignés; ainsi les vûes courtes ont les images des objets qui sont proches , tracées distinctement sur la Rétine , & les images des objets éloignés , confusément.

De-là ,

I.

114. Si la distance de la Rétine au Crystallin BC est trop petite , Fig. 35.

I ij

100 VI. ENTRETEN

c'est une vûe longue.

Les rayons FKG , FLG , partis de l'objet éloigné F se trouveront réunis sur la Retine G ; les rayons DHE , DIE , partis de l'objet voisin D , ne se réuniront

* N. qu'au-delà en E * : donc l'image
III. de l'objet éloigné sera distincte sur la Rétine , l'image de l'objet voi-

* N. sin y sera foible & confuse*. Donc
103. c'est une vûe longue *.

* N. 112. Ainsi comme le Verre convexe
* N. 86. rend les rayons convergents * , il corrigera le défaut des vûes longues.

I I.

115. Si la Rétine est trop éloignée , c'est une vûe courte.

Fig. 35. Les rayons DHE , DIE partis de l'objet voisin D seront réunis sur la Rétine E ; les rayons FKG , FLG partis de l'objet éloigné F , seront réunis en G avant que de rencontrer la Rétine E * :
III. * N.

donc l'image de l'objet voisin D sera distincte; celle de l'objet éloigné F sera confuse*: donc c'est une vûe courte*. * N. 108.

Ainsi comme le Verre concave rend les rayons divergents*, il corrigera le défaut des vûes courtes. * N. 112. N. 88.

I I I.

116. Si le Crystallin est segment d'une Sphère trop grande, c'est une vûe longue.

Les rayons DHE, DIE, partis de l'objet voisin D, iront se réunir en E au-delà de la Rétine G*, la Sphère plus grande réunissant les objets plus loin (a); les rayons FKG, FLG partis de l'objet éloigné F pourront se réunir Fig. 35. * N. 80.

(a) La Lentille qui est segment d'une Sphère plus petite, trace sur le papier l'image distincte de l'objet à une moindre distance, que la Lentille qui est segment d'une Sphère plus grande.

* N. sur la Rétine G* ; donc c'est une
 III. vûe longue (a).

IV.

Fig. 35. 117. Si le Crystallin BC est Seg-

(1) Dans un âge avancé, d'ordinaire on lit mieux à une certaine distance que de près, les caractères éloignés d'un pied ou deux, que d'un demi-pied. C'est que la Rétine se trouvant trop proche du Crystallin, les rayons qui viennent de près, ne sont pas réunis encore, quand ils tombent sur la Rétine.

Au contraire, les rayons qui viennent de plus loin, se trouvent réunis sur la Rétine.

Mais pourquoi dans un âge avancé la Rétine se trouve-t-elle trop près du Crystallin pour recevoir les rayons réunis ?

Cela peut venir de plusieurs causes. 1°. Le Nef optique qui se resserre, tire l'œil en dedans, comme il paroît assez dans les Viellards, dont les yeux sont moins saillants en dehors que dans les jeunes gens ; & la Rétine arrêtée par l'Os de la tête, se trouve trop près du Crystallin.

2°. Si l'âge vient à dessécher les fibres qui font le tissu des ligamens ciliaires, ils applatissent, en se resserrant, la membrane qui enveloppe le Crystallin, à peu près, comme une Bourse dont l'on tire les côtés opposés, s'applatit ; & le Crystallin prend en s'applatissant lui-même, la figure d'un segment de Sphère plus grande, qui rendant les rayons plus divergents, les réunit plus tard & plus loin.

SUR LA DIOPTRIQUE. 103
*ment d'une Sphère trop petite , c'est
une vûe courte.*

Dans une Sphère plus petite ,
les rayons rompus en sortant se
réunissent à une moindre distan-
ce * : ainsi le Crystallin trop petit ^{* N. 86.}
BC réunira en G trop près de lui,
avant la Rétine E , les rayons
FKG, FLG partis de l'objet éloi-
gné F : mais il réunira sur la Ré-
tine E les rayons DHE , DIE
partis de l'objet voisin D * : donc ^{* N. 111.}
c'est une vûe courte *.

Enfin, les Télescopes, les Mi- ^{* N. 112.}
croscopes , les Lunetes qui sup-
pléent aux défauts de la vûe , ne
méritent-ils pas que nous nous
réunissions pour voir comment ils
y suppléent ?

EUDOXE. Ou plutôt , est-il un
sujet qui le mérite mieux ?

VII. ENTRETEN.

Sur les Télescopes.

EUDOXE. Voilà des Télescopes ; & vous allez, Ariste , nous montrer la route que les rayons y tiennent pour rapprocher de nous les objets les plus éloignés.

ARISTE. Je dirai du moins ma pensée là-dessus m'expliquant à ma manière.

118. D'abord le Telescope est un Tuyau , qui par le moyen de plusieurs Verres , semble rapprocher en effet les objets , & les rend plus distincts.

119. Le Verre qui est le plus près de l'objet est l'*Objectif*, & celui qui est plus proche de l'œil l'*Oculaire*. S'il y a plus de deux Verres dans la Lunette , il n'y a

qu'un Objectif ; les autres sont Oculaires.

120. Deux sortes de Télescopes, l'Astronomique & le Terrestre. Le Télescope Astronomique est composé d'un Objectif convexe ou plan-convexe & d'un Oculaire convexe.

Le Télescope Terrestre est composé de plus de deux Verres ; ordinairement d'un Objectif, & de trois Oculaires.

Faut-il construire un Télescope Astronomique ?

EUDOXE. Commençons par là.

121. *ARISTE.* Hé bien , 1°. *Fig. 36.* On insère à l'extrémité d'un tuyau un Objectif C plan-convexe ou convexe des deux côtés, & qui soit portion d'une Sphère plus grande.

2°. Je mets à l'autre extrémité du tuyau un Oculaire G convexe des deux côtés, & qui soit portion d'une Sphère plus petite, le

plaçant à une juste distance du

* N. Foyer commun. C'est un Télé-
120. scope Astronomique*.

Et je dis que l'œil placé au Foyer de l'Oculaire, verra l'objet distinctement, dans une situation renversée, & grossi dans la raison de la distance du Foyer de l'Oculaire à la distance du Foyer de l'Objectif.

I.

122. *L'objet paroîtra distinct.*

1°. Comme les objets vûs au
Télescope Astronomique sont
fort éloignés, les rayons partis du
même point viennent parallele-
* N. 33. ment tomber sur l'Objectif* :
donc ils se réuniront à quelque
* N. 79. distance du Verre*.

2°. L'endroit où les rayons se-
ront réunis par l'Objectif, est le
* N. Foyer même de l'Oculaire*,
121. puisque c'est un Foyer commun:
donc les rayons qui s'étant croi-
sés dans ce Foyer, viendront se

entre dans l'Oculaire, en sortent parallèles *.

*N.81.

Or les objets éloignés vus par ces rayons parallèles paroissent distincts, parce que ces rayons étant pas divergents, font tous efficaces, ou portent tous leur impression sur l'organe de la vûe : donc l'objet paroîtra distinct.

I I.

123. *L'objet paroîtra renversé.*

Soit A Foyer commun des deux Verres C, G; BC distance = CA. Un rayon DBE parti du côté droit D de l'objet doit passer par B *: donc B étant Foyer du Verre C, le rayon EF sorti de l'Objectif après deux réfractions, sera parallèle à l'axe BG *: & par conséquent rompu par l'Oculaire en G, il rencontrera l'axe dans le foyer H de l'Oculaire G*. *N.92. *N.81. *N.80.

Ainsi, comme l'œil est dans le foyer H, ou auprès, le point D

108 VII. ENTRETEN.

du côté droit de l'objet paroîtra dans la ligne droite FH , tandis que le point I du milieu paroîtra *N.93. dans l'axe ICG *. Donc ce qui est à droite doit paroître à gauche, & au contraire : donc l'objet paroîtra renversé.

I I I.

124. L'objet paroîtra augmenté dans la raison de la distance du Foyer de l'Oculaire à la distance du Foyer de l'Objectif.

Je dis que l'objet vû sans Télescope est à l'objet vû au Télescope , comme la distance du Foyer de l'Oculaire à la distance du Foyer de l'Objectif.

Fig. 36. 1°. L'objet ID vû du point H , ou du point B , le reste égal , c'est même chose , à cause de la grande distance BI qui rend insensible la distance BH.

2°. Le demi-diamètre ID vû au Télescope , est vû sous l'angle

G^* ; ainsi GF est l'objet ID ^{$* N.$}
 du Télescope ^{$123.$} ^{$* N.$}

°. Soit $AG=GH$, distance ^{$102.$}

Foyer H à l'Oculaire G : les
 les en G étant droits & com-
 entre côtés égaux, les deux
 angles AFG , HFG sont
 ux (a) ; donc l'angle $FHA =$
 H . Ainsi GF vû de A ou de
 , c'est même chose, & l'on
 it regarder AG comme la di-
 ce du Foyer de l'Oculaire.

4°. Tirez AL parallèle à MF ,
 à BE : donc l'angle $GAL =$
 $MF = CBE (b) = DBI$ opposé
 sommet, angle sous lequel
 paroît à la simple vûe.

Ainsi $GL = ID$ vû sans Téles-
 pe, comme $GF = ID$ vû au
 élescope.

5°. $BM = EF$ entre mêmes
 ralleles BE , MF , & $CG =$
 F entre mêmes paralleles CE ,

(a) Géométrie, N. 136.

(b) Ibid. N. 104.

110 VII. ENTRETEN

GF (a) : donc $BM = CG$, deux grandeurs égales à une EF étant égales entr'elles. Donc si de $CG = BM$ l'on ôte la quantité commune CM, reste $GM = BC$ distance du Foyer de l'Objectif.

Il suffit donc de prouver que $GL. GF :: AG. GM$.

Or puisque l'angle commun G est droit, & que l'angle $GAL = GMF$, les deux Triangles LAG, FMG sont semblables (b), donc $GL. GF :: AG. GM$ (c).

125. De-là 1°. Comme la distance du Foyer à la Lentille est le demi-diamètre dans le Verre,

N.80. convexe des deux côtés, ou le diamètre dans le Verre plan-convexe* ; si l'Objectif est convexe

*N.79. des deux côtés, le Télescope augmente le demi-diamètre apparent de l'objet dans la raison

(a) Géométrie, N. 40.

(b) Ibid. N. 133.

(c) Ibid. N. 150.

SUR LA DIOPTRIQUE. 111

de demi-diamètre de l'Oculaire
de demi-diamètre de l'Objectif.
l'Objectif est plan-convexe,
croissement apparent se fera
as la raison du demi-diamètre
l'Oculaire au diamètre de
bjectif.

Ainsi, comme le demi-diamé-
de l'Oculaire est contenu plus
fois dans le diamètre de l'Ob-
tif, que dans son demi-diamé-
, l'objet ID vû sans Télesco-
est contenu plus de fois dans
bjet apparent ID vû au Téles-
pe avec un Objectif plan-con-
xe: donc le Télescope augmen-
ra plus si l'Objectif est plan-con-
xe, que s'il étoit convexe des
eux côtés.

126. Si l'Oculaire est segment
une moindre Sphère, & l'Ob-
tif, d'une plus grande; la raison
a demi-diamètre de l'Oculaire
a demi-diamètre, ou au diamé-
e de l'Ojectif en fera moindre,

112 VII. ENTRETIEN

ou la distance du Foyer de l'Oculaire sera contenue plus de fois dans celle du Foyer de l'Objectif (*a*); & par conséquent l'objet

* N. apparent en sera plus grand *.

24. 127. La distance de l'Oculaire à l'Objectif est composée de celles des Foyers de l'Objectif & de l'Oculaire; d'ailleurs la distance du Foyer dans le Verre convexe des deux côtés est le demi-diamé-

* N. 80. tre *; dans le Verre plan-convexe,

* N. 79. c'est le diamètre *. Ainsi, la longueur du Télescope est la somme des demi-diamètres des Verres si l'Objectif est convexe des deux côtés; c'est la somme du demi-diamètre de l'Oculaire & du diamètre de l'Objectif, si l'Objectif est plan-convexe.

Mais parce que le demi-diamètre de l'Oculaire, eu égard au diamètre ou au demi-diamètre de l'Objectif, est fort petit, on dé-

(*a*) Géométrie, N. 393.

termine

ermine la longueur du Télescope sur le demi-diamètre ou le diamètre de l'Objectif ; la distance du Foyer de l'Objectif est-elle de 12 pieds ? C'est un Télescope de 12 pieds (a).

128. EUDOXE. Mais , Ariste , avec votre Télescope , comment vous y prendriez-vous pour observer , ou les Taches du Soleil , ou une Eclipsé de Soleil ?

ARISTE. Ce sont deux Problèmes.

PROBLÈME I.

Observer les Taches du Soleil avec un Télescope.

1°. Si l'on couvre tout l'Ob-

(a) Comme les vûes courtes voyent mieux par des rayons plus divergents , ou qui se réunissent plus loin * , ayant la Rétine trop éloignée du CrySTALLIN ; il faut qu'elles approchent davantage l'Oculaire de l'Objectif : alors l'image qui est dans le Foyer de l'Objectif , sera plus proche de l'Oculaire ; & les

jectif, ne laissant qu'un trou d'une ligne de diamètre, on verra tout le Soleil impunément, parce qu'on le verra par l'impression de peu de rayons reçus dans l'œil.

2°. Sans couvrir l'Objectif, des Verres plans colorés, de couleur verte sur tout, mis devant l'Oculaire, diminueront l'action des rayons. Deux Verres enfumés, collés l'un contre l'autre, la fumée ou la suie en dedans, avec un contour de papier qui les tiennent unis, sont très-bons pour amortir la vivacité des rayons.

3°. On peut recevoir la lumière du Soleil dans une chambre obscure par l'Objectif d'un Télescope inséré dans une Boule de bois mobile, insérée elle-même dans une Fenêtre. Un Carton blanc posé verticalement sur un

rayons reçus par l'Oculaire, venant de plus près, ils sortiront plus divergents; & se réunissant plus loin, ils le feront sur la Rétine.

plan mobile, avancera ou reculera jusqu'à ce que l'image de cet Astre sur le Carton soit distincte & exactement terminée par un cercle qui sera parallele au plan apparent du Soleil *.

* N. 30.

Un fil tendu par un plomb, coupant l'image par le milieu, tracera sur le Carton dans le cercle un filet d'ombre qui pourra servir à fixer la situation des Taches, que l'on gravera ou que l'on peindra sur le Carton même dans les endroits où elles paroîtront, observant sur une Pendule l'instant de l'apparition de chacune dans tel point.

EUDOXE. Mais comme l'œil placé au Foyer du Télescope Astronomique, voit les objets dans une situation renversée, les Taches sembleront aller, ce semble, vers l'Orient quand elles avanceront vers l'Occident.

ARISTE. Cela est vrai : mais

K ij

l'Optique corrige l'erreur en nous avertissant de placer à l'Occident ce qui paroît vers l'Orient.

PROBLÈME II.

Observer une Eclipse de Soleil avec le Telescope.

1°. On observe l'Eclipse comme les Taches.

2°. Si du point correspondant au centre du Soleil sur le Carton, l'on décrit un cercle égal à l'image du Soleil, que l'on divise le demi-diamètre en six parties égales, & que par les divisions on décrive des cercles concentriques, l'on verra dans les différences de l'ombre sur les divisions différentes, de combien de parties ou de doigts est l'Eclipse.

Enfin, comme le Telescope Astronomique représente distinctement la grandeur apparente des Astres, & qu'il importe assez peu

qu'ils paroissent renversés , ou non , ce Télescope est bon pour les Astres. Mais il n'est pas également bon pour les objets terrestres ; le renversement apparent empêche de discerner l'objet autant qu'on peut le faire avec le Télescope Terrestre. Venons donc à ce Télescope.

Construire un Télescope terrestre.

129. D'abord je place à l'extrémité antérieure d'un tuyau un *Fig. 37.* Objectif D , convexe des deux côtés ou plan-convexe , qui soit segment d'une plus grande Sphère.







Ensuite , je mets trois Oculaires O , I , L , convexes des deux côtés , & segmens de Sphères égales entr'elles , en sorte que la distance de l'une à l'autre soit la somme des distances des Foyers des deux. C'est le Télescope terrestre.


PROPOSITION I.

130. *A ce Télescope , l'objet paroîtra distinct.*

On regarde par ce Télescope
Fig. 37. un objet éloigné. Ainsi les rayons
 tomberont sur l'Objectif D de ce
 Télescope , comme sur l'Objec-
Fig. 36. tif C du Télescope Astronomique :
 & le rayon ABCEG , après avoir
 passé par le Foyer B de l'Objec-
 tif , représentera distinctement en
 G son objet A , comme le rayon
 DBEFH , après avoir passé par
 le Foyer B de l'Objectif C ,
 représente distinctement en H
 * N. l'objet D * , & par la même
122. raison.

Or le rayon EGHKM tient
 une route semblable à celle de
 ABCEG , puisque G est Foyer du
 Verre I , comme B , du Verre D ,
 & que la distance des deux Ver-
 res I , L , est la somme des distan-
 ces de leurs Foyers , comme la





distance des deux premiers Verres D, O* ; donc l'objet étant * N. représenté distinctement en G, ^{121. &} il sera représenté distinctement en ^{129.} M, Foyer du dernier Oculaire L. Donc l'objet paroîtra distinct.

PROPOSITION II.

131. *L'objet paroîtra dans sa situation naturelle.*

Je dis que l'œil en M verra le ^{Fig. 37.} point A, à droite, où il est.

En G, Foyer du premier Oculaire, l'œil verroit le point A, à gauche suivant la direction du rayon efficace GE* : donc en M * N. l'œil voyant le point A suivant une ^{123.} direction contraire MK, il verra ce point à droite. Donc l'œil verra le point A à droite.

Aussi le rayon KM qui vient de la droite, étant continué jusques dans le fond de l'œil, portera son impression ou l'image du

120 VII. ENTRETEN.

point A dans le côté gauche de
N. 96. la Rétine.

Donc le point A doit paroître
N. 93. en K ; ou ce qui revient au mê-
N. même, en A : car la différen-
124. ce de distance BM est insensible,
& LK, n'est que AR vû au Té-
lescope (a).

PROPOSITION III.

132. *La grandeur apparente de
l'objet croîtra dans la raison de la
distance du Foyer d'un Oculaire à la
distance du Foyer de l'Objectif.*

Fig. 37. Je dis qu'au Foyer M la gran-

Fig. 37. (a) Pour disposer les Verres mécanique-
ment, 1^o. L'on regardera l'objet au travers
des deux premiers D, O, les rapprochant
ou les éloignant jusqu'à ce que l'objet pa-
N. roisse très-distinctement, mais renversé.

124. 2^o. L'on disposera de même les deux au-
tres Verres I, L, de manière qu'ils représen-
tent fort distinctement l'objet, & renversé.

3. Les deux oculaires I, L, étant dispo-
*N. sés de la sorte, on les approchera des pre-
130. miers Verres D, O, jusqu'à ce que l'objet pa-
**N. roisse distinct* & dans sa situation naturelle*.

131. deur

deur apparente de l'objet AR croîtra dans la raison de la distance ML, à la distance DB, qui est la distance de l'Objectif D à son Foyer B.

Par la construction, $EO = LK$, $OG = ML$; & l'angle droit $EOG = KLM$: donc le Triangle $OEG = LKM$; & par conséquent l'angle $LMK = EGO$ (a).

Cela posé; au Foyer G, l'objet AR vû sous l'angle EGO croîtra dans la raison de OG à DB*.

Or au Foyer M, AR vû sous le même angle $LMK = EGO$, croîtra de même*: donc au Foyer M la grandeur apparente de l'objet AR croîtra dans la raison de la distance ML, à la distance DB.

133. De-là 1°. On changera le Télescope Astronomique, en ôtant deux Oculaires, sans qu'il y ait de changement dans la grandeur apparente des objets, puis-

(a) Géométrie, N. 136.

que la grandeur apparente de l'objet vu en M ou en G, est la même.

* N. me *.

132.

2°. Comme la distance réciproque des Oculaires est petite, si l'on met trois Oculaires, le Téléscopé n'en est guères plus long (a).

EUDOXE. Et nous voyons enfin comment les meilleurs Téléscopes rapprochent de nous les objets sensibles, mais éloignés, terrestres ou célestes.

ARISTE. Quand verrons nous comment les Microscopes nous font discerner les objets les moins sensibles ?

EUDOXE. Le sujet pique trop ma curiosité pour ne me rappeler pas bientôt ici.

(a) Selon les Observations du P. Dechaux, 1°. Il est à propos de couvrir les extrémités des Verres pour éviter une espèce d'Iris qui semble environner l'objet. 2°. L'œil doit se trouver dans l'axe de tous les Verres. 3°. Il est bon de noircir le tuyau en dedans, pour absorber les rayons inutiles.

VIII. ENTRETIEN.

Sur les Microscopes.

EUDOXE. **P**As un moment de temps à perdre ,
Ariste. Il faut que vous vous expliquiez d'abord , & le plus vite qu'il sera possible sur les Microscopes.

134. *ARISTE.* Hé bien , le Microscope est un instrument qui représente les petits objets & plus distincts & plus grands. Le Microscope simple n'a qu'un Verre ; le Microscope composé en a plusieurs.

PROPOSITION I.

135. *Si l'on met un petit objet* Fig. 38.
AB au Foyer du Verre convexe CD
d'un Microscope simple , & que l'œil
soit placé fort près de l'autre côté de
 Lij

la Lentille ; l'objet paroîtra distinct.

Puisque l'objet AB est au Foyer de la Lentille , les rayons partis de chaque point de l'objet seront
 *N.81. parallèles en sortant *, & sans s'écarter, tous reçûs dans l'œil ; donc ils seront tous efficaces ; & venant se réunir sur la Rétine , ils y formeront une image vive & distincte.

PROPOSITION II.

Fig. 38. 136. Dans la même hypothèse , l'objet AB paroîtra dans sa situation naturelle.

Si le rayon FG se rompt en sortant de la Lentille ; après la réfraction , il est parallèle au rayon
 *N.62. d'incidence BN * : car les parties opposées N, F, de la Surface sont deux Plans parallèles infiniment
 *N.65. petits *. Donc le rayon total BN-FG entre dans l'œil O comme s'il n'y avoit point de Verre , portant son impression en G ; il en

est de même du rayon AH. Or si l'on ôtoit la Lentille CD, l'objet AB paroîtroit dans sa situation naturelle : donc il y paroîtra.

Aussi par l'impression faite en G, l'extrémité B doit paroître en B ; par l'impression faite en H, l'autre extrémité A doit paroître en A*.

*N.93.

PROPOSITION III.

137. *Le Microscope simple augmente la grandeur apparente de l'objet AB dans la raison de la distance du Foyer à la distance de l'endroit, où il faut placer l'objet pour le voir distinctement à la simple vue.* Fig. 38.

1°. Les rayons AH, BG, entrent dans l'œil comme s'il n'y avoit point de Verre* : donc l'objet réel AB paroît sous l'angle GEH = * N.
AEB sous lequel il seroit vû sans 136.
Verre*.

2°. L'objet réel vû sans Verre 102.
en L, paroît confus en L, distinctement en M, parce que les rayons

126 VIII. ENTRETEN.

partis de L , venant de trop près ;
 sont trop divergents à la sortie de
 la Lentille CD pour entrer tous
 dans l'œil O , & que les rayons
 partis de M venant de plus loin,
 sont moins divergents en sortant
 *N.83. de la Lentille CD *. Or au Mi-
 * N. croscopie, l'objet paroît distinct * :
 136. donc il paroît comme s'il étoit en
 M , ou vû sous l'angle $IEK =$
 AEB : donc le diamètre apparent
 * N. est IK * ; ainsi EL est la distance
 102. du Foyer ; EM , la distance où il
 faut placer l'objet pour être vû
 exactement sans Verre.

En un mot, AB est l'objet réel ;
 IK , l'objet apparent ; EL , la di-
 stance du Foyer ; EM , la distan-
 ce où il faut placer l'objet.

Cela posé ; je dis que $AB. IK$
 $:: EL. EM$.

Les Triangles AEL , IEM ,
 ou LEB, MEK sont semblables(a).
 Donc $AL. IM :: EL. EM$: donc

(a) Géométrie , N. 133.

AB. IK :: EL. EM , les routs étant comme les moitiés (a).

138. EUDOXE. Or on sçait par l'expérience , que les yeux bons voyent distinctement un objet à la distance de 8 doigts.

Ainsi , le Microscope simple Fig. 38. fait d'un Verre convexe ou d'une Lentille CD , augmente le diamètre AB de l'objet dans la raison de la distance EL du Foyer , à la distance de 8 doigts = EM.

Si la distance EL du Foyer ou le demi-diamètre de la Lentille est de $\frac{1}{2}$ doigt ; AB. IK :: $\frac{1}{2}$ 8 :: 1. 16 : donc IK. AB :: 16. 1 (b).

Et par conséquent le diamètre apparent de l'objet sera seize fois plus grand que le diamètre réel.

ARISTE. Ce que vous dites , Eudoxe , fait naître dans mon esprit quelques réflexions.

(a) Géométrie , N. 150.

(b) Calcul Littéral , N. 144.

I.

Fig. 38. 139. Le diamètre apparent IK excédera d'autant plus le diamètre réel AB, que la distance EL du Foyer sera plus petite.

Car plus la distance EL sera petite, plus la distance EM, qui est constante, c'est-à-dire, tou-

* N. jours de 8 doigts *, aura grande
138. raison à EL (a), & par conséquent plus IK aura grande raison à AB, ou plus IK contiendra de fois AB : car $IK. AB :: EM.$

* N. EL *.

137.

I I.

140. Plus le Verre convexe d'un Microscope est segment d'une moindre Sphère, plus il augmentera la grandeur apparente de l'objet.

Dans le Verre - convexe des deux côtés la distance du Foyer
* N. 80. est le demi diamètre *; dans le

(a) Calcul Littéral, N. 90,

Verre plan-convexe, c'est le diamètre * : donc plus le Verre con-*N.74.
vexe est segment d'une moindre
Sphère, plus la distance du Foyer
est petite, le demi-diamètre ou le
diamètre en étant plus petit (a);
& par conséquent plus le diamé-
tre apparent sera grand*.

* N.
139.

I I I.

141. *Dans le Microscope simple ,
le Verre convexe des deux côtés aug-
mentera au double du Verre plan-
convexe.*

Si le Verre est convexe des Fig. 38
deux côtés, la distance du Foyer
sera le demi-diamètre ou $\frac{1}{2}$ *; si le*N.80.
Verre est plan-convexe, la distan-
ce du Foyer est le diamètre, ou 1* : *N.74.
donc dans le premier cas, la gran-
deur apparente IK est à la gran-
deur réelle AB, comme 8. à $\frac{1}{2}$,
ou 16 à 1* ; dans l'autre cas, IK. * N.
AB :: 8. 1 : ainsi, dans le premier 139.

(a) Géométrie, N. 393.

130 VIII. ENTRETEN
cas, $IK = 16$; dans le second,
 $IK = 8$: or 16 est double de 8:
donc dans le Microscope, &c. (a).

I V.

142. *Il faut que les vûës courtes
approchent l'objet de la Lentille.*

Alors les rayons qui sortiront
de la Lentille seront plus diver-
gents * ; or les vûës courtes ayant
la Rétine plus éloignée du Cry-
stallin , voyent mieux par des
rayons plus divergents, qui se ré-
unissent plus loin *.

V.

143. *Enfin plus l'œil s'approchera
du Verre , plus l'objet sera distinct.*

Fig. 38. Comme les rayons BEG, AEH,
partis des extrémités A , B , de
l'objet s'écartent en sortant du

(a) Une Lentille d'eau augmenteroit moins
l'objet qu'une de Verre , les segmens de Sphé-
re supposés égaux , parce que la distance du
Foyer doit être plus grande dans la première

* N. 86. où la réfraction est moindre *.

Verre * ; l'œil en perdra d'autant * N.
moins qu'il sera plus proche. 136.

EUDOXE. Ne construirons-nous pas un Microscope à plusieurs Verres ?

ARISTE. 1°. Soit l'objet AB dans Fig. 39.
le Foyer , ou près du Foyer de la Lentille CD : l'objet apparent EF sera d'autant plus grand que la Lentille CD sera portion d'une Sphère plus petite *.

* N.

2°. Soit une seconde Lentille 139.
GH , disposée à l'égard de l'image ou de la grandeur apparente EF , comme la première Lentille CD par rapport à l'objet AB ; l'œil en IK.

L'image ou la grandeur apparente EF sera augmentée par la seconde Lentille GH , comme l'objet AB par la première CD , par la même raison.

Dans ce Microscope , l'image IK de l'objet étant au fond de l'œil dans une situation naturelle * , 136.

* N.

* N. il paroîtra renversé *.

100. Une troisième Lentille placée de même , renversant sur la Rétine la seconde image , fera voir l'objet dans sa situation naturelle , mais moins distinct. La multitude des Lentilles , réfléchissant beaucoup de rayons , les rend inefficaces.

EUDOXE. Aussi le célèbre *Leuwenoech* , qui fit tant d'observations avec les Microscopes , ne se servoit guères que de Microscopes simples.

...*ARISTE.* Enfin la grandeur apparente des objets vûs à la Lunette , ou à la simple vûe , varie selon les distances & les situations différentes : comment cela se fait-il ? C'est ce que nous examinerons , quand il vous plaira , supposant les objets vûs d'un œil précifément.

IX. ENTRETIEN.

Sur la différence des grandeurs apparentes dans les distances ou les situations différentes.

EUDOXE. **H**E bien , Ariste ; nous allons donc voir les objets croître & diminuer sans qu'il arrive aucun changement dans leur grandeur.

ARISTE. Oui :

PROPOSITION I.

144. *D'abord , le même objet vu directement du même point , paroîtra plus grand de près que de loin.*

Soit l'objet $BF \equiv DG$ parallèle à BF , perpendiculaire de même sur AFG . Fig. 4.

L'œil placé en A , je dis que BF paroîtra plus grand que DG .

Les angles en G , F , faits

134 IX. ENTRETIEN

par des perpendiculaires , étant droits (a), & l'angle en A , commun; les Triangles EAG, BAF, sont semblables (b) : donc $EG.BF :: AG.AF$ (c) : or $AG > AF$ dans l'hypothèse : donc $EG > BF$: donc $DG = BF < EG$: donc le côté AD est en dedans de l'angle $EAG = BAF$: ainsi l'angle $BAF = EAG > DAG$: donc BF, qui sera vû sous un plus grand angle

* N. que DG, paroîtra plus grand*.

103. *EUDOXE.* De-là, 1°. De deux objets BF, DG, égaux, mais inégalement éloignés, le plus proche doit paroître plus grand.




2°. A même distance, un objet plus grand paroîtra plus grand.

Mais les grandeurs apparentes du même objet, seront-elles réciproquement comme les distances?

(a) Géométrie, N. 95.

(b) Ibid N. 133.

(c) Ibid. N. 150.





PROPOSITION II.

145. Si l'angle de vision , ou la
grandeur apparente * est double , la ^{* N₁}
distance de l'objet à l'œil ne sera pas ^{102.}
soudouble..

Soient D , l'œil ; CE l'objet ^{Fig. 41.}
perpendiculaire sur DE ; CBE ,
angle de vision double , ou gran-
deur apparente ; CDE angle op-
tique soudouble ; BEC , angle
droit.

Je dis que la distance BE n'est
pas soudouble de la distance DE ,
ou que $BE < BD$.

L'angle extérieur $CBE = BC-$
 $D + BDC$ (a) , vaut $2BDC$ par
l'hypothèse : donc l'angle BCD
 $= BDC$: donc le Triangle CBD
étant isocèle, le côté $BC = BD$ (b) ;
or le côté $BE < BC$, hypoténu-

(a) Géométrie , N. 129.

(b) Ibid. N. 120.

136 IX. ENTRETEN.

se (a) ; donc $BE < BD$.

146. De-là, 1°. Si l'angle de vision, ou la grandeur apparente CDE est soudouble, la distance ne sera pas double précisément, elle sera plus que double, puisque $BD > BE$.

147. 2°. A une distance double, l'angle de vision, ou la grandeur apparente sera plus que soudouble :

Fig. 41. (1) Soit $DF = FE$; Je dis que l'angle $CDE > \frac{1}{2} CFE$.

* N. L'angle $CDE = \frac{1}{2} CBE$ * : or
145. l'angle extérieur $CBE > CFE$ (b) :
donc l'angle $CDE > \frac{1}{2} CFE$.

Ainsi l'objet ne diminuera pas en raison inverse des distances.

PROPOSITION III.

148. Néanmoins, dans les grandes distances, on peut dire que les grandeurs apparentes sont en raison inverse des distances mêmes.

(a) Géom. N. 401. (b) Ibid. N. 129.

Si

Si la distance croît de manière *Fig. 41.* que l'angle CBE ne soit plus que de quelques secondes (a), je dis que l'angle $CBE = 2CDE$. * * N. $CDE :: DE. BE.$ 145.

La différence des angles BEC, BCE sera insensible * : donc cel- * N. 33. le des côtés opposés BE, BC le fera ; & par conséquent $BD = BC$ * , sera sensiblement égal à * N. BE : donc $DE = 2BE$: donc $CBE = 2CDE$. $CDE :: DE. BE.$ 145.

EUDOXE. Ici , Ariste , vous allez résoudre quelques Problèmes.

PROBLÈME I.

149. Connoissant la grandeur *Fig. 42.*

(a) L'objet qu'on ne peut voir que sous un angle d'une seconde , ne paroît plus , ou ne paroît que comme un point. De-là , l'objet est insensible à un certain excès de distance , parce que l'angle de vision diminuant toujours , l'image tracée sur la Rétine , devient trop petite , & l'impression trop foible pour se faire sentir. Ainsi la transpiration est insensible au moment qu'elle ouvre les pores.

138 IX. ENTRETEN

apparente ADE, avec la distance DE, trouver la grandeur vraie AE.

ARISTE. Connoissant l'angle D, plus l'angle droit E, je connois l'angle A (a); & en disant: comme le Sinus de l'angle A du complément est au Sinus de l'angle D, grandeur apparente; ainsi le côté DE est au côté AE, grandeur vraie (b); j'aurai la grandeur vraie dans le quatrième terme de la proportion (c).

PROBLÈME II.

Fig. 42. 150. EUDOXE. Connoissant la grandeur vraie AE avec la distance DE, trouver la grandeur apparente, ou, l'angle optique ADE.

Je dirai: DE. AE :: Sinus total. Tangente de l'angle ADE (d).

(a) Géométrie, N. 122.

(b) Trigonométrie, N. 61.

(c) Calcul Littéral, N. 137.

(d) Trigonométrie, N. 65.

Or ayant la Tangente d'un angle, on a l'angle (a).

PROBLÈME III.

151. EUDOXE. Connoissant la *Fig. 42*
grandeur vraie AE & la grandeur
apparente D, trouver la distance DE.

ARISTE. Connoissant l'angle D, plus l'angle droit E, & par conséquent l'angle A; je dirai: le Sinus de l'angle D donne tant pour le côté opposé AE: combien le Sinus de l'angle A pour le côté DE (b)? & j'aurai DE.

EUDOXE. Considérons maintenant deux objets vûs sous le même angle.

ARISTE. Volontiers.

PROPOSITION V.

152. Deux objets FH, GD, *Fig. 43*
vûs sous le même angle DAG ont

(a) Trigonométrie, N. 58.

(b) Ibid. N. 59.

des grandeurs proportionnelles à leurs distances AF, AG.

Je dis que $GD.FH :: AG.AF$.

Puisque AG & AF sont les distances par l'hypothèse, elles sont perpendiculaires sur GD, FH (a): donc les angles en G, F, sont droits (b): d'ailleurs l'angle A est commun: donc les Triangles AGD, AFH sont semblables (c): donc $GD.FH :: AG.AF$ (d).

Fig. 43. De-là, si deux objets FH, GD vus sous le même angle, ont des grandeurs proportionnelles à leurs distances AF, AG, le plus petit FH dérobera le plus grand GD, à la vûe. Car $FH.GD :: AF.AG :: AH.AD$ (e): ainsi comme le rayon AG est AF prolongé;

(a) Géométrie, N. 34.

(b) Ibid. N. 95.

(c) Ibid. N. 133.

(d) Ibid. N. 150.

(e) Ibid. N. 150.

AD fera AH prolongé; & par conséquent les rayons visuels AG, AD, ne feront que raser les extrémités de GD.

PROBLÈME IV.

153. EUDOXE. Trouver la di-^{Fig. 43.}
stance AG, où il faut qu'un objet
d'une grandeur donnée GD se trou-
ve, pour paroître de la grandeur
d'un autre objet FH placé à une di-
stance donnée AF.

ARISTE. $FH.GD :: AF.AG^* : * N.$
 ainsi connoissant les trois premiers¹⁵²
 termes de la proportion, j'aurai
 dans le quatrième la distance (a).

Soient $FH = 6$ pieds; $GD = 30$; $AF = 20$: je dirai: $6.30 :: 20.100$: donc $AG = 100$ pieds.

PROBLÈME V.

154. Trouver la hauteur AB au-^{Fig. 44.}
dessus de la ligne horizontale AC ti-
rée par l'œil D, où il faut élever un

(a) Calcul Littéral, N, 137.

142 IX. ENTRETEN

objet d'une grandeur donnée BF, afin qu'il paroisse aussi grand qu'un autre objet d'une hauteur donnée AG paroît à une distance donnée AD.

ARISTE. 1°. Connoissant par l'hypothèse dans le Triangle ADG rectangle en A, le côté AD, distance de l'œil D, & le côté AG, hauteur de l'objet AG; je prens l'angle ADG sous lequel on voit AG; & qui doit être égal à l'angle BDF, puisque les objets dont la grandeur apparente est la même doivent être vûs sous des * N. angles égaux *. Je dis donc AD.
203. AG :: Sinus total : Tangente de l'angle ADG; & je connois l'angle ADG (a).

2°. J'imagine un cercle passant par les points D, B, F, & qui ait pour centre H. L'angle au centre BHF sera double de l'angle BDF à la circonférence (b): donc

(a) Trigonométrie, N. 65.

(b) Géométrie, N. 116.

si du centre H, on tire la perpendiculaire HI, $BI = \frac{1}{2}BF$ (a), & l'angle $BHI = \frac{1}{2}BHF = BDF$.

Ainsi connoissant dans le Triangle BIH, rectangle en I, les angles & un côté BI, je connois les côtés IH & BH (b).

3°. Du centre H, j'abaisse sur AK la perpendiculaire HC; & AI étant aussi perpendiculaire sur AK par l'hypothèse, HC sera parallèle à AI (c): donc les perpendiculaires IH, AC, comprises entre HC & AI sont égales (d): donc si de IH connue, on ôte la distance connue AD de l'œil D, restera DC.

4°. Dans le Triangle DHC, rectangle en C, connoissant DC & DH = BH connue, je connois HC (e).

(a) Géométrie, N. 61. 114.

(b) Trigonométrie, N. 64.

(c) Géométrie, N. 44.

(d) Ibid. N. 40.

(e) Trigonométrie, N. 65.

144 IX. ENTRETEN

5°. Enfin, $HC = AI$ comprise entre mêmes parallèles; & de AI connue, j'ôte la moitié BI de la hauteur BF de l'objet à élever: reste la hauteur AB , qu'il falloit trouver.

Plaçons l'œil entre deux parallèles.

PROPOSITION VI.

Fig. 45. 155. Si l'œil A se trouve entre deux parallèles BC, DE , elles sembleront s'approcher l'une de l'autre à mesure qu'elles seront plus éloignées de l'œil.

Je dis que l'intervalle CE plus reculé, paroîtra plus petit que FG

Puisque BC & DE sont parallèles, $CE = FG$ (a): or le même objet, vû directement du même point, paroît plus petit de loin que

* N. de près *. Donc CE paroîtra plus petit que FG .

(a) Géométrie, N. 40.

EUDOXE.

EUDOXE. Aussi, 1°. Comme les deux parallelessembleront se réunir enfin, l'on ne verra rien au-delà.

2°. Dans deux rangées d'arbres paralleles, ceux qui sont plus éloignés, paroissent plus proches les uns des autres; dans une longue Galerie, le planché paroît s'abaisser, & le pavé s'élever.

156. *Mais plaçons l'œil dans un point quelconque de la circonférence d'un cercle : la même corde, tantôt plus, tantôt moins éloignée, paroîtra-t-elle inégale ?*

ARISTE. Non : la même corde paroîtra égale dans tous les points d'un arc de cercle.

Je dis que la corde BC vûe des points F, E, &c. inégalement éloignés paroîtra la même. Fig. 46.

Les angles inscrits BFC, BEC sont égaux ayant pour mesure la moitié du même arc BC (a) : donc

(a) Géométrie, N. 114.

Tome III.

N

BC fera vûe des points F, E, sous même angle : donc BC y paroî-

* para égale *.

103. Ainsi, 1°. L'œil changeant de situation ou décrivant un cercle, pourra s'approcher ou s'éloigner de l'objet sans que l'objet augmente ou diminue de grandeur apparente.

2°. Par la même raison, si l'œil est immobile à la circonférence, & qu'une ligne se meuve dans le cercle, de manière qu'elle soit toujours corde du même arc; la grandeur apparente de la ligne sera toujours la même.

3°. Si l'œil se trouve dans un angle d'un Poligone régulier, les côtés paroîtront égaux (a).

(a) Une figure de Salle avantageuse pour un Théâtre, c'est ce semble, un segment de cercle, où les Acteurs soient dans la corde BC, & les Spectateurs dans le grand arc FED, puisque les Acteurs y seront vûs également de tous les endroits F, D, E, &c. D'ailleurs, c'est la figure qui contient le plus de monde.

PROBLÈME I.

157. EUDOXE. Mais il s'agit de trouver un point d'où deux grandeurs inégales BC , CD , vues au même temps, paroîtront égales.

ARISTE. 1°. Des extrémités B & C , à l'ouverture de BC , je décris deux arcs qui se coupent en E ; & du point E , je décris un cercle qui passe par B & C . Fig. 47.

2°. Des extrémités C & D , intervalle CD , je décris deux arcs qui se coupent en F ; & du point F , je décris un cercle qui coupe le premier en A .

Et je dis que A est le point d'où les deux grandeurs inégales BC CD paroîtront égales.

Les lignes BC & CD , étant rayons, sont côtés, chacune, d'un Exagone (a) : donc les arcs BC & CD sont semblables: donc les angles inscrits BAC & CAD ,

(a) Géométrie, N. 238.

148 IX. ENTRETIEN

ayant pour mesure des moitiés d'arcs semblables , sont égaux (a) : ainsi les angles sous lesquels BC & CD sont vûs du point A , sont égaux ; & par conséquent A est le point d'où ces grandeurs inéga-

* N. les paroîtront égales *.
103.

PROBLÈME II.

Fig 48. 158. EUDOXE. Trouver deux points A , B , l'un plus proche des deux extrémités de l'objet , l'autre plus éloigné ; mais tellement situés , que l'objet paroisse plus petit vû du point le plus proche A , & plus grand vû du point le plus éloigné B.

ARISTE. 1°. Des extrémités C , D , de l'objet , intervalle quelconque , je décris deux arcs qui se coupent en E ; & du point E , à l'ouverture de EC , je décris un cercle CFBD qui passe par les extrémités C , D , de l'objet.

2°. D'un autre point G , je dé-

(a) Géométrie , N. 114.

cris un cercle plus grand CHAD par les mêmes extrémités C, D.

3°. Sur CD prolongé en I, j'éleve une perpendiculaire IB coupant le second cercle en A, & rencontrant le plus petit en B.

Enfin soient les angles inscrits CFD, CHD, CBD, CAD.

Je dis que le point A est plus près des extrémités C & D de l'objet CD, que B; que néanmoins du point A, l'objet CD paroîtra plus petit que du point B.

1°. Puisque IB est perpendiculaire sur CI, & par conséquent CI sur IB (a), $AD < BD$, & $AC < BC$ (b), les obliques plus éloignées de la perpendiculaire & tirées du même point, étant plus longues. Donc le point A est moins éloigné des extrémités C, D, que B.

2°. L'angle $CAD = CHD$ inf-

(a) Géométrie, N. 27.

(b) Ibid. N. 35.

150 IX. ENTRETIEN.

crit de même au même cercle (a),
& l'angle $CBD = CFD > CHD$
qui l'enferme (b) : donc l'angle
 $CAD < CBD$: donc l'objet CD,
vû de A sous un plus petit angle
que de B', paroîtra plus petit de A
que de B *.

103. * N. Ces principes , Eudoxe , &
deux figures me rappellent encore
deux Propositions.

PROPOSITION. VII.

Fig. 49. 159. Si deux objets égaux AB
& BD sont vûs, l'un AB directe-
ment ; l'autre BD obliquement, du
même point C hors du cercle ; l'objet
AB vû directement paroîtra plus
grand.

Je dis donc que AB paroîtra
plus grand que BD.

BE & BD , vûs sous le même

103. * N. angle paroîtront égaux*. Or BE
n'est qu'une partie de $AB = BE$.

(a) Géométrie , N. 114.

(b) Ibid. N. 132.

+ EA : autrement le Triangle BDE seroit ifocele, & par conséquent l'angle BED étant droit, le Triangle BDE auroit deux angles droits (a), ce qui n'est pas possible (b) : donc AB paroîtra plus grand que BD.

PROPOSITION VIII.

160, Enfin, les parties égales Fig. 50.
BC, CD, DE, EF du même intervalle BF qui s'éloigne de l'œil A, paroîtront inégales, plus petites à mesure qu'elles s'éloigneront.

Je dis que BC paroîtra plus grande que CD, CD que DE, DE que EF.

L'angle $BAC > CAD > DAE > EAF^*$: donc la partie BC^{*N.22.} fera vûe sous un plus grand angle que CD; CD, que DE, &c. donc la partie BC paroîtra plus grande que CD; CD, que DE, &c.

(a) Géométrie, N. 127.

(b) Ibid. N. 122.

EUDOXE. Aussi dans une rangée d'arbres B, C, D, E, F, également éloignés les uns des autres ; à mesure qu'ils s'éloignent de l'œil qui les regardent, ils semblent s'approcher les uns des autres. Les illusions des grandeurs apparentes sont infinies.

ARISTE. Les illusions des figures sont elles moins fréquentes ?

EUDOXE. C'est ce que nous verrons , Ariste , dès que je pourrai vous revoir.

X. ENTRETIE N.

Sur les illusions de la vue par rapport aux figures.

ARISTE. OUI , Eudoxe , les figures apparentes trompent nos Sens comme les grandeurs.

EUDOXE. Nous avons vû avec

quelque plaisir les illusions de celles-ci, je verrai de même les illusions de celles-là.

ARISTE. Vous voulez donc que dans quelques Propositions, je retrace quelques erreurs de nos Sens.

PROPOSITION I.

161. Un arc *ACF* vu de loin *Fig. 51*, par l'œil *D* placé dans le même plan paroîtra une ligne droite.

1°. L'arc *ACF* & la ligne droite *BE*, étant $\hat{\text{A}}$ s sous le même angle $\angle \text{ADF} = \angle \text{DE}$ paroîtront égaux*.

2°. Tandis que la distance per-^{* N.}mettra de discerner les parties inégales *BA*, *EF*, comprises entre la Tangente *BE* & l'arc *ACF*, la courbure se distinguera: mais quand l'excès de distance rendra ces parties *BA*, *EF*, insensibles, les points *A* & *F* seront confondus avec les points *B*, *E*, de la

154 X. ENTRETEN

droite BE ; & la ligne courbe ACF paroîtra droite , faisant sur la Rétine la même impression que la ligne droite BE.

EUDOXE. Et c'est ce que l'expérience nous apprend.

ARISTE. Du cercle , venons à la Sphère.

PROPOSITION II.

162. *Une Sphère vûe de loin paroîtra un cercle.*

EUDOXE. C'est une suite évidente de la première Proposition.


Fig. 52. * N. 1°. L'arc AB doit paroître à l'œil E une ligne droite AC*.


2°. Que l'arc AB tourne sur l'axe AD : il décrira un hémisphère dont AC représentera successivement tous les arcs en tournant. Or AC décrira un cercle.

163. Mais un objet angulaire. . .

ARISTE. Il paroîtra rond de loin.

Fig. 53. Soit le Quarré BCDE avec ses





Triangles mixtes FGB, GHC, HIE, IFD, fans le cercle FGHI :

Eloignez le Quarré BCDE : à une certaine distance , je ne le verrai plus* ; à cette distance inf- * N.
crivez au Quarré le cercle FGHI : 148.
je verrai le cercle à cause de son excès de grandeur.

Or l'objet total sera une Surface quarrée placée à la même distance: donc une Surface quarrée y paroîtra ronde : donc un objet angulaire paroîtra rond de loin.

EUDOXE. Aussi généralement les Poligones réguliers paroissent ronds de loin.

ARISTE. Sans doute , la distance fait paroître les Astres plus ronds qu'ils ne le sont.

PROPOSITION III.

164. Si l'œil A regarde directe- Fig. 54
ment d'une juste distance le centre B

156 X. ENTRETEN

d'une figure régulière CDEF, en sorte que l'Axe optique AB soit perpendiculaire au Plan CDEF, on verra la vraie figure de l'objet.

1°. Le rayon $BC = BF = BD = BE$; le côté AB est commun; & les angles compris ABC, ABF, ABD, ABE sont égaux, étant droits (a) : donc les Triangles BAC, BAF, BAD, BAE sont égaux (b): donc les angles CAB, FAB, DAB, EAB, opposés à côtés égaux sont égaux, aussi-bien que les côtés CA, FA, DA, EA.

2°. Puisque les côtés CD, DF, FE, EC de la figure régulière sont égaux, comme les côtés CA, DA, FA, EA, les Triangles CDA, DFA, FEA, ECA le sont (c); & par conséquent les angles homologues CAD, DAF, FAE, EAC.

(a) Géométrie, N. 95.

(b) Ibid. N. 137.

(c) Ibid. N. 134.

Donc les côtés CD, DF, FE, EC, seront vûs sous angles égaux, ainsi que les rayons BC, BD, BF, BE: donc ceux-là paroissant égaux comme ceux-ci *, on verra la vraie figure de l'objet. * N. 103.

EUDOXE. De-là, si l'œil A regarde perpendiculairement le centre B d'un cercle CDEF, on en verra la vraie figure, puisque tous les diamètres CE, FD, &c. paroîtront égaux, étant vûs sous mêmes angles *. * N. 164.
Mais si l'on regarde obliquement le centre du cercle.....

ARISTE. Voyons ce qui doit arriver dans cette hypothèse.

PROPOSITION IV.

165. Si la distance de l'œil au centre du cercle regardé obliquement est égale au demi-diamètre, on verra encore la vraie figure du cercle.

Car tous les diamètres seront vûs sous même angle, c'est-à-dire, sous un angle droit, ou inscrit &

PROPOSITION V.

166. Mais si la ligne droite qui va de l'œil au centre du cercle est plus longue que le demi-diamètre, & qu'elle fasse deux angles droits avec un diamètre & un angle obtus avec un autre diamètre; le diamètre avec lequel elle fera les angles droits, paroîtra plus grand que l'autre diamètre.

Que la ligne droite AB tirée de Fig. 56. l'œil A au centre B du cercle, & plus grande que le rayon BD, fasse avec le diamètre DF deux angles droits, & avec le diamètre CE un angle obtus ABE : je dis que DF paroîtra plus grand que CE.

Fig. 57. 1°. Soit le Triangle IKL =
& 56. AFD, l'angle KIL = DAF; les angles IMK, IML droits aussi-bien que les angles ABF, ABD; MK = ML; IM, côté commun:

(a) Géométrie, N. 115.

ainsi le Triangle $KIM = LIM$ (a),
& par conséquent la base $IK = IL$, & $MK = BC = BE = BF$,
 $= BD$.

2°. Je circonscris un cercle au Triangle IKL (b).

3°. Je fais l'angle obtus $KMG = ABE$, le côté $MG = MI$; l'angle $GML = ABC$.

4°. Tirez les lignes LG, LH, KH, KG . Le point G est hors du cercle, puisque $MG = MI > MH$; car de deux Sécantes intérieures, celle qui passe par le centre, est la plus grande (c).

Cela posé, 1°. Le côté $MK = BE$, $MG = AB$, & l'angle compris $GMK = ABE$, par la construction: donc le Triangle $MGK = BAE$: donc l'angle $MGK = BAE$.

2°. Le côté $ML = BC$; MG

(a) Géométrie, N. 121.

(b) Ibid. N. 136.

(c) Ibid. N. 75.

$= AB = MI$, & l'angle $GML = ABC$ supplément aussi : donc le Triangle $GLM = ACB$: donc l'angle $MGL = BAC$, ainsi l'angle $KGL = EAC$ (a).

3°. L'angle $KHL = KIL$ inscrit de même & appuyé sur le même arc (b).

Or l'angle enfermé $KHL > KGL$ qui l'enferme (c).

Donc l'angle $KIL > KGL = EAC$: donc l'angle $KIL > EAC$.

Mais l'angle $DAF = KIL$: donc l'angle $DAF > EAC$. Ainsi DF sera vu sous un plus grand angle que CE ; & par conséquent DF paroîtra plus grand que CE .

De-là, 1°. *Plus le rayon visuel AB sera oblique au diamètre CE , plus le diamètre paroîtra petit* : car à mesure que l'angle obtus ABE augmentera, l'angle aigu ABC

(a) Géométrie, N. 122.

(b) Ibid. N. 114.

(c) Ibid. N. 139.

diminuera : or à mesure que l'angle ABC diminuera , l'angle ACB croîtra, accroissement qui causera de la diminution dans l'angle optique EAC. *Fig. 55.*

167. 2°. Si l'œil A regarde obliquement le centre B d'un cercle CDEF hors de la distance du demi-diamètre BY , le cercle doit paroître allongé.

Car tandis que l'œil verra obliquement un diamètre CE , il verra perpendiculairement un diamètre DF coupant le premier CE à angles droits (a) : donc un diamètre DF paroîtra plus grand que l'autre CE coupé à angles droits* : *N. 166.* donc la figure doit paroître allongée.

EUDOXE. Supposons que la ligne tirée du centre du cercle à l'œil, est plus courte que le demi-diamètre.....

ARISTE. Dans ce cas contraire,

(a) Géométrie, N. 93.

Tome III.

O

162 X. ENTRETIEN
il y a de la différence dans l'effet.

PROPOSITION VI.

168. Si la ligne droite qui va du centre du cercle à l'œil, est plus petite que le demi-diamètre du même cercle, & qu'elle soit oblique à un diamètre & perpendiculaire sur un autre; le diamètre sur lequel elle est perpendiculaire, paroîtra plus petit que l'autre.

Fig. 56. Soit ZB, moindre que le demi-diamètre BD, mais perpendiculaire sur DF, & oblique à CE, enforte que l'angle ZBE soit obtus; & l'angle ZBC, aigu.

Je dis que DF paroîtra plus petit que CE.

Fig. 58. 1°. Je fais le Triangle NPO & 56. = DFZ, enforte que RO soit égal à ZB, & perpendiculaire sur NP., que les lignes NR, RP soient égales à BF & BD, & l'angle NOP = DZF.

2°. Au Triangle NPO, je cir-

construis un cercle (a). $RO < BF = NR$ par la construction : ainsi le centre du cercle n'est pas en RO , mais en RS .

3°. Je fais l'angle $NRT = ZBE$, prenant $RV = RO = ZB$.

4°. De deux Sécantes parties de la circonférence, celle qui prolongée passeroit par le centre, est la plus courte (b) : donc $RT > RO = RV$; & par conséquent V est dans le cercle.

Enfin je tire les lignes NV & VP , NT & TP .

Cela posé; dans les Triangles VRN , ZBE , les côtés NR , RV , sont égaux aux côtés BE , BZ & l'angle compris est égal par la construction : donc les deux Triangles sont égaux (c) : donc l'angle $NVR = EZB$. Par la même rai-

(a) Géométrie, N. 110.

(b) Ibid. N. 76.

(c) Ibid. N. 136.

164 X. ENTRETEN

fon, le Triangle $VPR = ZCB$;
 & l'angle $RVP = BZC$: ainsi
 l'angle total $NVP = EZC$.

Or l'angle $NVP > NTP$ qui
 enferme NVP sur même base (a) ;
 $NTP = NOP$ appuyé sur même
 arc NSP , & l'angle $NOP =$
 DZF , par la construction : donc
 l'angle $EZC = NVP$, est plus
 grand que l'angle DZF : donc CE
 paroîtra sous un plus grand angle
 que DF : donc CE paroîtra plus
 * N. grand que DF * , ou DF plus
 103. petit que CE .

EUDOXE. C'est-à-dire, que si
 l'on regarde obliquement une fi-
 gure régulière hors de la distance
 du demi-diamètre , on ne verra
 * N. pas la vraie figure *. Considérons
 167. maintenant , non le plan du cer-
 168. cle , mais le tranchant.

ARISTE. Le tranchant ?

(a) Géométrie , N. 132.

PROPOSITION VII.

169. *Un œil ne verra pas la moitié de la circonférence d'un cercle, dont il regarde le tranchant directement.*

Soit le cercle ABCD dont le fig. 52.
plan couperoit l'œil, ou dont le tranchant BCD regarde directement l'œil E.

Je dis que l'arc BCD vû par l'œil E, est plus petit que la demi-circonférence.

Les angles ADE, ABE, faits par les Tangentes DE, BE, perpendiculaires sur les rayons AD, AB, étant droits (a), les angles CAD, CAB, sont aigus (b): donc les arcs CD, CB, sont moindres, chacun (c), que le quart de cercle: donc l'arc total BCD est plus petit que la demi-circonférence.

(a) Géométrie, N. 95.

(b) Ibid. N. 121.

(c) Ibid. N. 96.

PROPOSITION VIII.

170. *Ainsi un œil ne verra point la moitié d'une Sphère.*

Fig. 59. L'œil E ne verra que le segment de Sphère formé par l'arc BCD tournant sur la partie FC de l'axe AE, puisque toutes les Tangentes tirées du point E à la circonférence de la base dont BD sera diamètre, se trouveront égales à EB, ED: or ce segment ne fera pas la moitié de la Sphère: car chacun des arcs de la Surface sera moindre que la demi-circonférence *.

169.

PROPOSITION IX.

171. *L'œil qui s'approchera de la Sphère, en verra une moindre partie.*

Fig. 60. 1°. Du point A, l'œil voit l'arc BCD.

2°. Que l'œil s'approche en E: il ne verra que l'arc FCG $\angle$ BC.

D : car la Tangente EG ne peut toucher en D , ni au-delà : il faudroit toujours qu'elle passât par D ; & deux perpendiculaires ED, AD, se trouveroient élevées du même point D , extrémité du rayon HD ; ce qui n'est pas possible (a). Par la même raison , la Tangente EF touchera en deçà de B. Donc l'œil E qui ne peut voir que le segment compris entre les Tangentes , ne verra que l'arc $FCG < BCD$.

On peut en dire autant de tous les arcs qui feront la Surface du segment de Sphère vû du point A ou du point E : donc l'œil qui s'approchera de la Sphère , en verra une moindre partie.

PROPOSITION X.

172. *Mais cette moindre partie paroîtra plus grande.*

(a) Géométrie, N. 32.

Fig. 60. Je dis que l'arc $F\hat{C}G$ vû du point E , paroîtra plus grand que l'arc BCD vû du point A , ou que l'angle de vision $FEG > BAD$.

1°. Les Triangles HBA, HFE , sont rectangles en B, F , puisque AB, EF sont Tangentes (*a*) : donc les deux autres angles, dans chacun des Triangles sont égaux ; pris ensemble ; à un angle droit : donc les deux angles BHA, BAH , pris ensemble, valent les deux angles FHE, FEH : or l'angle $BHA > FHE$, de la valeur de l'angle BHF : donc l'angle $FEH > BAH$.

2°. Par la même raison, l'angle $HEG > HAD$.

Donc l'angle total $FEG > BAD$.

EUDOXE. Et la plus petite partie paroîtra la plus grande. Le mouvement des corps ne sera-t-il pas encore une source d'erreurs ?

(*a*) Géométrie, N. 79.

ARISTE.

ARISTE. Et cette source d'erreurs, Eudoxe, fera une occasion de vous revoir.

XI. ENTRETEN.

Sur les illusions de la vûe par rapport au mouvement des corps.

EUDOXE. **R** Edites nous précisément ce que ces Figures vous diront ; le temps me permet de vous écouter , mais sans interrompre le fil des choses que vous direz.

ARISTE. Venons donc d'abord au fait.

PROPOSITION I.

173. *L'objet qui se meut , paroît en mouvement , parce qu'il fait impression successivement sur diverses parties de la Rétine.*

Tome III.

P

170 XI. ENTRETEN

Fig. 61. 1°. Soit l'œil immobile ABC : quand l'objet est en D, le rayon DC, qui trace l'image en C & passe par le centre E de la Rétine, fait voir l'objet en D*. Par la même raison, l'objet D passant en F, son image qui passera en B, le fera voir en F par le rayon BEF; enfin l'objet allant de F en G, l'image qui coulera de B en A, le fera voir en G, extrémité du rayon AG.

**N. 93.*

Ainsi l'œil immobile verra l'objet aller d'Orient en Occident, parce que l'image de l'objet ira sur la Rétine d'Occident en Orient.

Fig. 62. 2°. Soit l'œil en mouvement H, I, K : quand l'œil est en K, l'Axe optique KLM fait voir l'objet L en M; quand l'œil est en I, l'Axe optique ILN fait voir l'objet L en N. L'œil est-il en H? l'Axe optique HLO fait voir l'objet L en O*. Ainsi l'objet immobile L semble aller de M en N, de

**N. 93.*

N en O, ou d'Orient en Occident, tandis que l'œil est porté d'Occident en Orient.

De-là, le rivage, les arbres qui le bordent, les côteaux-mêmes semblent avancer rapidement vers l'Occident, tandis que c'est l'œil qui est emporté vers l'Orient.

PROPOSITION II.

174. Si deux objets également éloignés de l'œil vont avec la même vitesse, le plus éloigné semble aller plus lentement.

Jedis que si l'œil A voit le corps B & le corps C parcourir en même temps les lignes égales BD, CE, le mouvement du corps C plus éloigné paroîtra plus lent. Fig. 63.

Puisque la ligne $CE = BD$ plus proche, l'angle $CAE < BAD$: car le même objet vû de plus loin directement, paroît sous un plus petit angle * : mais la ligne CE

173 XI. ENTRETIE

vûe sous un plus petit angle , pa-
 * N. roîtra plus petite * : donc C sem-
 103. blera faire moins de chemin: donc
 son mouvement paroîtra plus lent.

Ainsi , le plus proche de ces
 corps paroîtra laisser l'autre der-
 rière sans aller plus vite.







PROPOSITION III.

Fig. 63. 175. Si deux objets B, C, inéga-
 lement éloignés parcourent dans le
 même temps des espaces BF, CE,
 proportionnels à leurs distances AB,
 AC; ces espaces parcourus BF, CE,
 paroîtront égaux.

Si $BF. CE :: AB. AC$, les cô-
 tés des Triangles ABF, ACE
 étant proportionnels, l'angle BAF
 $= CAE$ (a) : donc BF & CE fe-
 ront vûs sous un même angle :

* N. donc BF & CE paroîtront égaux *.
 103. De-là , si les vitesses réelles
 BF, CE, sont proportionnelles
 aux distances AB, AC, les vites-

(a) Géométrie, N. 159.





les apparentes BAF, CAE sont les mêmes.

PROPOSITION IV.

176. Si deux objets B, C, sem- Fig. 63.
blent parcourir dans le même temps
des espaces égaux, ces espaces BF,
CE, sont proportionnels aux distan-
ces à l'œil A. $BF. CE :: AB. AC.$

Si les espaces parcourus BF,
CE; paroissent égaux, ils seront
vûs sous même angle*: donc l'an- * N.
gle $BAF = CAE$: donc les an- 103.
gles droits B, C, étant égaux, les
deux Triangles AFB, AEC se-
ront semblables (a): donc $BF.$
 $CE :: AB. AC.$

De-là, si les vitesses apparen-
tes sont les mêmes, les vitesses
réelles seront proportionnelles
aux distances.

PROPOSITION V.

177. Si l'objet plus éloigné va
(a) Géométrie, N. 133.

174 XI. ENTRETEN.

plus lentement , la vitesse de l'objet plus proche doit paroître plus grande qu'elle n'est.

Fig. 64. Soient $BF = AE$, espace parcouru par l'objet plus éloigné B ; AC , espace parcouru dans le même tems par l'objet plus proche A.

Les vitesses étant comme les espaces parcourus dans le même tems , la vitesse de B fera $BF = AE$; la vitesse de A fera AC : donc EC fera l'excès réel de la vitesse de A sur celle de B ; $GE + EC$, l'excès apparent : car BF paroîtra égal à AG , vû sous le même an-

* N. gle $AOG = BOF$ * : or $GE + EC > EC$.

PROPOSITION VI.

Fig. 64. 178. *L'objet B mù avec une vitesse quelconque paroîtra toujours en repos , si la raison de l'espace BF parcouru dans une seconde à la distance BO , est imperceptible.*

L'espace parcouru BF est à la

distance BO, comme la Tangente de l'angle BOF, sous lequel l'espace parcouru BF est vû, au Sinus total (a): donc si la raison de BF à BO est imperceptible, la raison de la Tangente au Sinus total, sera insensible: donc l'espace parcouru BF, qui ne sera vû que sous un angle insensible, sera imperceptible *: donc l'objet B * N. mû avec une vitesse quelconque ^{148.} dans cet espace BF. paroîtra en repos.

Ma pensée, Eudoxe, s'accorde-t-elle avec la votre?

179. EUDOXE. Parfaitement. Dans une seconde de temps, un Astre, comme le Soleil, décrit par son mouvement journalier un arc de 15 secondes, & cet arc est imperceptible: donc un objet regardé sous un angle de 15 secondes, ne se discernera pas; à plus forte raison, si l'angle de vi-

(a) Trigonométrie, N. 65.

175 XI. ENTRETIEN.

sion est plus petit encore (a).

De-là, un objet mû avec une vitesse quelconque paroît en repos, si l'espace parcouru dans une seconde est à la distance, comme 1 à 1400.

Fig. 54. Car si l'espace BF parcouru dans une seconde est à la distance BO, comme la Tangente d'un arc de 15 secondes au Sinus total, c'est-à-dire, comme 727 à 10000000 (b) ou 1 à 1375, à peu près; l'objet mû paroît en

* N. repos * : or (c) $\frac{1}{1400} < \frac{1}{1375}$ (d).

179. ARISTE. Nous avons considéré

(a) On peut dire qu'un objet vû sous un angle de 30 secondes ne se discerne pas, puisque l'aiguille d'une montre fait un arc de 30 secondes dans une seconde de temps & qu'on ne discerne pas son mouvement.

(b) Trigonométrie, N. 58.

(c) Calcul Littéral, N. 99.

(d) Les Astres qui sont dans un mouvement très-rapide, paroissent en repos, parce que la raison de l'espace qu'ils parcourent dans une seconde, à leur distance à la Terre, est imperceptible. Mais on s'apperçoit que les Astres sont mûs, en comparant l'endroit où on les a vûs, avec l'endroit où on les voit.

la vûe dans un œil : quand le ferons-nous dans les deux yeux ?

EUDOXE. Dès demain.

XII. ENTRETIEN.

Sur les propriétés de la vûe considérée dans les deux yeux.

EUDOXE. **H**E bien , Ariste , pourquoi le même objet vû des deux yeux ne paroît-il pas toujours double ; pourquoi le paroît-il quelquefois ; comment deux objets peuvent-ils paroître le même ? &c.

ARISTE. Vous voulez donc , Eudoxe , que j'essaye d'expliquer encore quelques mystères d'Optique.

180. D'abord l'*Horoptere* , ou *Fig. 65* : le terme de la vûe distincte , est la ligne BC qui passe par la section D des deux Axes optiques ED ,

HD, parallelement à la ligne HE qui joint les centres H, E, des deux yeux.

Le plan de l'Horoptere est le plan qui passe par l'Horoptere perpendiculairement au plan HDE, où sont les Axes optiques ED, HD.

PROPOSITION I.

Fig. 65. 181. Si l'objet D est dans l'Horoptere BC, il sera vû des deux yeux sans paroître double.

Les deux Axes optiques DH, DE, partis du même point D coupant l'Horoptere au même point

* N. D *, & traversant les yeux sans
 * N. 94. se rompre *, feront voir l'objet
 * N. 93. dans le même point D *. Ainsi, l'objet D sera vû des deux yeux sans paroître double.

PROPOSITION II.

Fig. 66. 182. Si l'objet A est hors de l'Ho-

roptere BC, il paroîtra double, ou en B & C.

L'œil D verra l'objet A en B par le rayon DB; l'œil E verra le même objet en C par le rayon EC*, en regardant fixement F : *N. 93. donc A paroîtra double.

De-là, si l'on ferme l'œil D, l'objet disparoîtra en B, si l'on ferme l'œil E, l'objet disparoîtra en C.

EUDOXE. Aussi mettez un petit objet A, mais long, vis-à-vis le Nez à la distance d'un pied, environ, regardant fixement & directement F au-delà*. l'objet A paroîtra double, mais confusément; & plus vous regardez loin.. plus les deux images B & C semblent éloignées; l'une à droite, l'autre à gauche. Si vous rapprochez vos regards insensiblement de l'objet A, les images se rapprocheront. Enfin regardant A fixement, vous n'en voyez plus qu'un..

180 XII. ENTRETIEN

ARISTE. C'est par le même principe , que les gens ivres voyent tout double.

PROPOSITION III.

183. *Deux objets placés hors de l'Horoptere peuvent paroître le même.*

Fig. 67. Soient les deux objets A & B dans les deux Axes optiques CAD , EBD.

Je dis que A & B paroîtront le même objet en D.

A sera vû dans l'Horoptere FG
*N. 93. par le rayon CAD * , & par conséquent en D ; de même , B sera vû en D par le rayon EBD. Or deux objets vûs dans le même endroit , paroîtront le même , les traits de l'un étant confondus avec les traits de l'autre. Donc A & B paroîtront le même objet en D , surtout s'ils sont parfaitement semblables.

Mais au même temps, un autre rayon CBG fera voir l'objet B en G; & un autre rayon EAF, l'objet A en F. Ainsi l'on verra trois objets; & si les objets A & B sont parfaitement semblables, les trois paroîtront semblables. S'ils sont différents, celui du milieu D participera de la couleur de A & de celle de B: mais B paroîtra en G précisément avec sa couleur; A en F, avec la sienne précisément, parce que B ne paroîtra point en F, ni A en G.

PROPOSITION IV.

184. *Un corps opaque AB compris entre les deux Axes optiques CD, ED, ne dérobera aucune partie de l'objet FG aux deux yeux C, E, à la fois.* Fig. 68.

1°. De tous les points de la partie DG, on peut tirer des lignes droites en C; donc AB ne cache-

182 XII. ENTRETEN

ra point à l'œil C la partie DG de l'objet.

2°. De tous les points de la partie DF, on peut tirer des lignes droites en E : donc AB ne cachera point à l'œil E la partie FD de l'objet.

Donc un corps opaque AB, &c.

PROPOSITION V.

Fig. 63. 185. Mais le corps opaque AB compris entre les Axes optiques CD, ED, dérobera à un œil C une partie DF de l'objet, & une partie DG à l'autre œil E.

Car de la partie DE, on ne peut tirer des lignes droites en C; on n'en peut tirer en E de la partie DG: donc le corps opaque AB, &c.

PROPOSITION VI.

Fig. 68. 186. Si un corps opaque AB est compris entre les Axes optiques CD, ED, une partie DG vûe d'un œil C, est à la distance CE des deux

yeux , comme la distance GB d'une extrémité B du corps opaque à l'Horoptere FG , est à la distance de cette même extrémité B à l'œil E.

Je dis que DG. CE :: GB. BE.

CE est parallele à DG : donc l'angle GEC = DGE alterne (a) : ainsi les angles au sommet B étant égaux , les Triangles BDG , BEC sont semblables (b) : donc DG. GB :: CE. BE (c) ; & par conséquent DG. CE :: GB. BE (d).

PROPOSITION VII.

187. Si le diamètre AB d'une Sphère est égal à la distance récipro- Fig. 69.
que EC des deux yeux E & C ; & qu'une ligne droite DF tirée du centre D de la Sphère au milieu F de la distance EC , soit perpendiculaire sur cette distance , les yeux E & C.

(a) Géométrie , N. 101.

(b) Ibid. N. 133.

(c) Ibid. N. 150.

(d) Calcul Littéral , N. 144.

184 XII. ENTRETIEN.

portés autour de l'axe DF, verront tout l'hémisphère.

Soient les rayons CB, EA perpendiculaires sur les extrémités de EC.

1°. Les angles en D, F, C ; faits par des perpendiculaires étant droits (a), l'angle B l'est (b). D'ailleurs $BD = FC$ parallèle & compris entre mêmes parallèles (c) : ainsi CB perpendiculaire sur l'extrémité B du demi-diamètre BD, fera le rayon tangent par où l'œil C verra le point B, tandis que l'œil E verra le point A par le rayon EA, par la même raison.

2°. Puisque l'angle D est droit ; BG sera quart de cercle, aussi-bien que AG (d) ; & par conséquent les deux yeux verront le demi-cercle AGB.

Enfin, faites tourner le Rectan-

(a) Géométrie, N. 95.

(b) Ibid. N. 175.

(c) Ibid. 40. 44. (d) Ibid. N. 93.

gle BF ou AF sur l'axe DF : le quart de cercle BG ou AG décrira un hémisphère, qui sera vû comme AGB, tout entier.

PROPOSITION VIII.

188. Si la distance EC des yeux *Fig. 70.*
E, C, est plus grande que le diamètre $AF + FD$ de la Sphère, les yeux portés autour de l'axe FG verront plus que l'hémisphère.

1°. $EG = GC > AF$, par l'hypothèse.

2°. Le rayon visuel EH tangent en A, étant perpendiculaire sur AF (a), l'angle HAF est droit (b), l'angle AFH aigu, & par conséquent l'arc $AK > AB$. Par la même raison, $KD > DB$.

Ainsi l'arc AKD vû par les deux yeux E & C, doit être plus grand que l'arc ABD.

3°. Faites tourner le plus grand

(a) Géométrie, N. 79.

(b) Ibid. N. 93.

segment de cercle $AFDK$ sur l'axe GFH : ce segment décrira un segment de Sphère plus grand que l'hémisphère : or ce segment, les deux yeux E, C , le verront comme l'arc AKD : donc ils verront plus que l'hémisphère.

PROPOSITION IX.

Fig. 71. 189. Si la distance EC des deux yeux E, C , est moindre que la valeur du diamètre $AD + DB$, les yeux portés autour de l'axe FD verront moins que l'hémisphère.

Si la distance EC des yeux E, C , étoit égale au diamètre KL parallèle à EC , FC égaleroit DL ; & le rayon visuel se trouveroit parallèle à l'axe DFH *.

183. Ainsi, puisque $FC < DL = DB$, par l'hypothèse, le rayon visuel prolongé doit faire un angle aigu, par exemple, $CHF = BHD$ avec l'axe DH ; & ce rayon sera BCH *, faisant avec l'axe

DH & le demi-diamètre DB le Triangle BHD.

Cela posé ; l'angle DBH fait par le rayon tangent BC + CH étant droit, l'angle BDH = BDI est aigu , & l'arc BI = AI est moindre que le quart de cercle (a) : donc l'arc AIB est moindre que le demi-cercle : donc le segment de Sphère fait par ce segment de cercle tournant sur l'axe DH , sera plus petit que l'hémisphère. Or ce segment de Sphère sera le segment vû par les deux yeux : donc ils verront moins que l'hémisphère.

Enfin , verrons-nous, Eudoxe , comment l'on se voit soi-même : dans les Miroirs ?

EUDOXE. Je vous y reverrai bientôt.

(a) Géométrie, N. 79. 93.

XIII. ENTRETEN.

Sur les Miroirs plans.

ARISTE. Commencerons-nous, Eudoxe, par nous rappeler, à la vûe de ces figures, ce qu'il y a de plus général dans les Miroirs avant que d'entrer dans un détail suivi des Miroirs différents ?

EUDOXE. Cet ordre, Ariste, répandra le jour nécessaire pour suivre des rayons infiniment déliés dans leurs mouvemens réfléchis & rapides.

190. ARISTE. Parlons donc de la *Catoptrique* ou de la science des rayons réfléchis, & par conséquent des Miroirs qui sont des Surfaces extrêmement polies & propres à réfléchir la lumière.

191. La surface du Miroir est- Fig. 72.
 elle plane? C'est un Miroir plan;
 sphérique? c'est un Miroir conve-
 xe ou concave. Le point d'inciden-
 ce ou de réflexion est le point A qui
 reçoit le rayon direct BA, ou qui
 le réfléchit. A est point d'inciden-
 ce à l'égard de BA; point de ré-
 flexion à l'égard de AC.

192. La *Cathete d'incidence* est Fig. 72.
 une perpendiculaire BE tirée du
 point d'où part le rayon d'inciden-
 ce BA sur la Surface réfléchissante
 EG; la *Cathete de réflexion* ou de
 l'œil est une perpendiculaire CG
 tirée de l'extrémité C du rayon ré-
 fléchi AC sur la même Surface
 EG. La *Cathete d'inclinaison* est une
 perpendiculaire AD élevée sur le
 Miroir, du point A d'incidence
 ou de réflexion, & qui sert à dé-
 terminer l'angle d'inclinaison B-
 AD ou CAD, formé par le rayon
 d'incidence AB, ou par le rayon
 réfléchi AC avec la perpendicu-
 laire AD.

190 XIII. ENTRETIEN.

Enfin le rayon d'incidence fait avec le Miroir l'*Angle d'incidence* BAE ; le rayon réfléchi fait avec le Miroir l'*Angle de réflexion* CAG.

Cela supposé ;

PROPOSITION I.

193. *L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence.*

Fig. 72.

Soit le demi-cercle EFG perpendiculaire sur un Miroir EAG :

Ayant pris deux arcs égaux EH, IG, placez l'objet en B, & l'œil en C : l'œil C verra l'objet B ; & il ne le verroit pas si l'on couvroit le point d'incidence A : donc l'angle de réflexion CAG & l'angle d'incidence BAE auront pour mesure des arcs égaux, IG, EH : or les angles qui ont pour mesure des arcs égaux sont égaux : donc l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence.

De-là, 1°. Le rayon DA qui

tombe perpendiculairement sur le Miroir, revient sur lui-même.

2°. Le rayon d'incidence BA, le rayon réfléchi AC, la Cathete d'incidence BE, la Cathete de réflexion CG, & la Cathete d'inclinaison DA sont dans le même Plan.

EUDOXE. Et l'on pourra se regarder dans un Miroir sans se voir.

ARISTE. Oui, puisque le rayon d'incidence BA s'en va de l'autre part faisant un angle aigu $\text{CAG} = \text{BAE}$.

PROPOSITION II.

194. Une ligne droite DA qui Fig. 72. partagera par le milieu l'angle BAC formé par le rayon d'incidence BA & par le rayon réfléchi AC, sera perpendiculaire à la Surface EG du Miroir.

Je dis que DA sera perpendiculaire sur EG.

L'angle d'incidence $\text{BAE} =$

192 XIII. ENTRETEN

* N. CAG*, & l'angle $BAD = DAC$;
 194. puisque DA partage BAC par le milieu : donc les angles DAE ; DAG sont égaux & droits (a) : donc DA sera perpendiculaire sur EG (b).

Vous croyez apparemment ; Eudoxe , que chaque point du Miroir réfléchit des rayons qui viennent de chaque partie de l'objet.

EUDOXE. Chaque point de l'objet ne paroît-il pas dans chaque point du Miroir ?

ARISTE. Aussi.

PROPOSITION III.

Fig. 73. 196. Chaque point A du Miroir GAF sera le sommet de deux Pyramides BAC , DAE, dont l'une aura sa base dans l'objet BC ; & l'autre , dans l'œil DE , ou dans l'air.

Faisons venir les rayons BA ;

(a) Géométrie , N. 93.

(b) Ibid. N. 96.

CA

CA, de deux points opposés B, C, du Soleil : l'angle d'incidence $BAF > CAF$: donc l'angle de réflexion $DAG > EAG^*$: donc * N. les rayons, après avoir fait la Pyramide BAC en se réunissant en A, feront la Pyramide DAE en s'écartant. Donc le point A sera le sommet de deux Pyramides BAC, DAE. 194.

EUDOXE. Mais si deux rayons partis du même point du corps lumineux E, viennent tomber sur deux points C, D, du Miroir..... Fig. 74.

ARISTE. La réflexion les écartera encore : car l'angle d'incidence extérieur ECH étant plus grand que l'angle d'incidence EDH (a), l'angle de réflexion FCG sera plus grand que l'angle de réflexion BDG*. * N. 194.

EUDOXE. Aussi un Miroir plan ne brûle point seul, parce que loin de réunir les rayons dans un

(a) Géométrie, N. 129.

194 XIII. ENTRETEN
point, il les disperse.

PROPOSITION IV.


197. Dans le Miroir plan, l'objet paroît à la rencontre de la Cathete d'incidence & du prolongement des rayons réfléchis.


Soient A, l'objet; AB, AC, rayons d'incidence partis du même point A; BD, CE, rayons réfléchis; D, E, les yeux; AF, Cathete d'incidence; FG, prolongement de la Cathete $AF = FG$; BG, CG, prolongemens des rayons réfléchis BD, CE.

Je dis que l'objet A paroîtra en G.

1°. L'angle $FBG = DBH$ opposé
* N. au sommet $= FBA^*$; les angles en
194. F sont droits, & le côté FB, commun: donc FAB, FGB, sont deux Triangles égaux (a): ainsi, comme BA rencontre FA en A, BG ou DBG rencontre FG $= FA$ en G.

(a) Géométrie, N. 137.





2°. Par la même raison, CG ou ECG rencontrera FG en G.

Or l'objet paroît dans le point où les rayons réfléchis & prolongés DBG, ECG, se trouvent réunis, puisque ce sont des Axes optiques reçûs dans les deux yeux, & que l'objet paroît naturellement dans le point où les Axes sont réunis au dehors *.

*N. 93.

Donc dans le Miroir plan, l'objet paroît à la rencontre de la Cathète d'incidence & du prolongement des rayons réfléchis.

De-là, l'objet ne paroît pas double, quoiqu'il soit vû des deux yeux dans le Miroir.

PROPOSITION V.

198. *Dans le Miroir plan, après une réflexion, le lieu apparent de l'objet est autant au-delà du Miroir que l'objet est en deçà.*

G est le lieu apparent de l'objet A : or G est autant au-delà du
R ij

Fig. 75.

196 XIII. ENTRETIEN

Miroir FBH, que A est en deçà ;

* N. puisque $GF = FA$ *.

197. *EUDOXE.* Aussi un Miroir plan horizontal attaché au lambris d'un Cabinet fait paroître l'objet autant au - dessus du lambris , que l'objet est au-dessous.

ARISTE. Par la même raison , dans la Galerie de Versailles , ne croiriez vous point la voir de même au-delà des glaces ?

PROPOSITION VI.

199. *La distance de l'œil à l'image est la longueur du rayon réfléchi Fig. 75. & du rayon d'incidence.*

* N. Cette distance est $DB + BG$ * :

198. or DB est le rayon réfléchi , & $BG = BA$ rayon d'incidence , puisque le Triangle F G B =

* N. F A B *.

197. Ainsi l'objet A paroîtra par la réflexion , comme il paroîtroit directement s'il étoit en G.

PROPOSITION VII.

200. *Dans le Miroir plan horizontal, les grandeurs verticales paroîtront renversées.*

Soient le Miroir plan horizontal, ou l'étang BC ; la grandeur verticale, ou l'arbrisseau DE ; sa partie inférieure D ; la partie supérieure E. Fig. 76.

Je dis que DE paroîtra renversé.

E regardée de H en I, paroîtra en F ; & D regardée de H en K, paroîtra en G, puisque le lieu apparent de l'objet est autant au-delà du Miroir, que l'objet est en deçà * : donc E paroîtra plus * N.
au-delà du Miroir, ou plus près 198.
du centre de la Terre, que D.
Or un objet paroît renversé quand la partie supérieure semble être plus proche du centre de la Terre : donc DE paroîtra renversé.

198 XIII. ENTRETEN.

EUDOXE. Par la même raison, un Miroir plan horizontal redressera les objets renversés. Mais, Ariste, il s'agit de résoudre ici deux Problèmes qui viennent s'offrir à mon esprit.

PROBLÈME I.

Fig. 77. 201. Connoissant le point A d'où part le rayon, & le lieu de l'œil B, trouver le point de réflexion C.

* N. 193. ARISTE. Soient donc A & B, points connus; AD, Cathete d'incidence; BE, Cathete de réflexion*, perpendiculaires connues; AC, rayon d'incidence; CB, rayon réfléchi: je prens la distance DE des Cathetes... Il faut trouver le point de réflexion C, ou la distance CE de ce point à la Cathete de l'œil.

Les angles D, E, sont droits, étant faits par des perpendiculaires; & l'angle de réflexion BCE
* N. 194. $\equiv$ ACD, angle d'incidence*:

SUR LA CATOPTRIQUE. 199
 donc les Triangles CAD, CBE
 sont semblables (a) : donc AD.
 BE :: DC. CE (b) : donc AD +
 BE. BE :: DC + CE , ou DE.
 CE (c) : donc j'aurai CE dans le
 quatrième terme de la propor-
 tion.

EUDOXE. En un mot, comme
 la somme des Cathètes d'inciden-
 ce & de réflexion est à la Cathète
 de réflexion ; ainsi la distance des
 Cathètes est à la distance du point
 de réflexion à la Cathète de réflé-
 xion ; analogie qui donne le point
 de réflexion.

PROBLÈME II.

202. *Trouver par le moyen d'un
 Miroir plan une hauteur accessible.*

ARISTE. Soient AD la hauteur ; Fig. 77.
 AC, CB, les rayons d'incidence
 & de réflexion.

(a) Géométrie , N. 133.

(b) Ibid. N. 150.

(c) Calcul Littéral , N. 144.

200 XIII. ENTRETEN

1°. Ayant placé le Miroir DE horizontalement , je recule jusqu'à ce que j'y voie , par exemple , au point C , la cime A de la hauteur.

2°. Je prens l'élevation EB de l'œil B ; la distance EC du point E où je suis , au point de réflexion C , & la distance CD de ce point à la hauteur accessible . *

3°. Comme les Triangles CBE, CAD sont semblables * , je dirai
 * N.
 201. EC. CD :: EB. AD (a) : le quatrième terme de la proportion sera la hauteur accessible : & c'est la résolution du second Problème.

PROPOSITION VIII.

203. *Dans le Miroir plan , les grandeurs paralleles au Miroir paroîtront paralleles au Miroir.*

Fig. 78. Soient LS+SM, Miroir plan ; NO , grandeur parallele ; NF ,
 (a) Géométrie , N. 150.

OR, Cathetes d'incidence prolongées & perpendiculaires égales; $NL = LF = SR = OS$.

Je dis que NO regardée obliquement de P en X, Z, paroîtra parallele au Miroir LS + SM.

Le point N paroîtra en F, & le point O en R^{*}: donc l'apparence de NO fera FR: mais FR^{* N.} est parallele à LS (a), puisque LF & SR sont perpendiculaires égales: donc NO paroîtra parallele au Miroir LS + SM (b).

PROPOSITION IX.

204. *Les grandeurs inclinées au Miroir plan, y paroîtront inclinées.*

Soient BC, grandeur inclinée, Fig. 79; faisant avec le Miroir BD l'angle aigu CBD; CF & HK, Cathetes d'incidence, $CG = GF$, $HI = IK$.

Je dis que BC paroîtra en BF;

(a) Géométrie, N. 40.

(b) Ibid. N. 41.

202 XIII. ENTRETIEN.
faisant l'angle $FBD = CBD$.

1°. Le point C vû de l'œil O ;
paroîtra en F ; le point H , en K ;
* N. le point B , en B* : donc BF fera
198. l'apparence ou l'image de BC.

2°. Dans les Triangles BCG ,
BFG , les angles en G sont droits,
les côtés CG & GF égaux , &
BG commun , donc les deux
Triangles sont égaux (a) , & par
conséquent l'angle $FBD = CBD$.

Ainsi l'angle fait par la gran-
deur inclinée avec le Miroir , est
égal à l'angle fait par l'image avec
le Miroir.

PROPOSITION X.

205. *Si l'inclinaison du Miroir
plan varie d'un degré , celle du rayon
réfléchi varie de deux.*

Fig. 80. Soient AB , Miroir plan hori-
fontal ; CD rayon d'incidence ;
DE , rayon réfléchi par AB ; FG ,
le Miroir incliné , en sorte que

(a) Géométrie , N. 136.

l'angle FDA soit d'un degré; DB, le rayon réfléchi par FG, ou DE descendu en DB.

Je dis que l'angle EDB, variation du rayon, est double de l'angle FDA, variation du Miroir.

L'angle d'un degré FDA = BDG opposé au sommet; & l'angle d'incidence CDF = BDG, angle de réflexion *: donc CDF = FDA: donc CDA = 2FDA. ^{* N₄} 194.

Or l'angle de réflexion EDB = CDA, angle d'incidence correspondant: donc EDB = 2FDA: donc l'angle EDB est double de l'angle FDA.

EUDOXE. De-là, si l'on incline un Miroir plan, l'inclinaison du rayon réfléchi d'abord sera double de l'inclinaison du Miroir. Et si le Miroir tremble, le tremblement du rayon sera double (a).

(a) Ainsi dans l'attaque d'une Place, un Miroir suspendu à un Ouvrage dans une situation à réfléchir les rayons du Soleil, pourroit servir à découvrir le Mineur.

204 XIII. ENTRETEN

ARISTE. Aussi l'eau qui coule lentement, ne laisse pas de renvoyer les rayons fort loin & avec beaucoup de vivacité.

PROPOSITION XI.

Fig. 81. 206. Si le Miroir EC s'incline à un Plan horifontal EF, le Plan semblera monter au-delà du Miroir.

L'angle BEG, fait par l'image EI & le Miroir EC, répond à l'angle BEK fait par le Plan EF * N. & le Miroir EC*: donc l'angle
204. BEK diminuant par l'inclinaison, l'angle BEG diminue: or l'angle BEG ne peut diminuer de la sorte, que l'angle GEH n'augmente, ou que l'image EI ne semble monter.

EUDOXE. Aussi lorsque le Miroir s'incline vers le pavé, le pavé paroît s'élever au-delà du Miroir.

PROPOSITION XII.

207. *ARISTE.* Et si le Miroir s'incline d'un degré vers le Plan horizontal, ce Plan semble s'élever de deux.

Si l'angle BEK fait par le Miroir incliné & le Plan est de 89 degrés, l'angle BEG fait par l'image & le Miroir est aussi de 89 degrés *: mais l'angle BEH formé par le Miroir incliné & l'horizon, est de 91 degrés (a) : donc la différence ou l'élévation apparente GEH est de deux degrés.

Fig. 81.

* N.

204.

PROPOSITION XIII.

208. Si le Miroir IK est incliné de 45 degrés à l'horizon, l'image IM de l'objet horizontal IL y paroîtra verticale.

L'angle LIK fait par l'objet IL & le Miroir IK, étant de 45 degrés, l'angle MIK formé au-

(a) Géométrie, N. 122.

Fig. 82.

206 XIII. ENTRETEN.
 delà du Miroir par l'image IM &
 le Miroir IK, fera aussi de 45 dé-
 grés : donc l'angle total MIL fera
 droit : donc l'image IM paroîtra
 perpendiculaire à l'horison ou ver-
 ticale (a).

PROBLÈME I.

Fig. 83. 209. EUDOXE. *Par la même rai-
 son, ce semble, si le Miroir est in-
 cliné à l'horison de 45 degrés, l'ima-
 ge QO de l'objet vertical NO y pa-
 roîtra horizontale.*

Car l'angle NOP fera de 45
 degrés par l'hypothèse : or l'an-
 * N. gle QOP = NOP *: donc l'an-
 198. gle QON fera droit : donc QO
 sera perpendiculaire sur NO, ain-
 si que l'horison (b) : donc l'image
 QO sera parallèle à l'horison.

Encore un Problème, Ariste.

(a) Géométrie, N. 96.

(b) *Ibid.*

PROBLÈME II.

210. *Faire voir un corps pesant qui semble monter de lui-même.* Fig. 34

ARISTE. Soit le Plan incliné AD, creusé en zic-zague, & propre à diriger la boule B en C.

Sur la partie supérieure HD du Plan incliné, je dispose un Miroir DG tellement incliné au Plan AD que ce plan y paroisse vertical *. * N_i

La partie supérieure B du 208. Plan incliné AD paroîtra dans la partie inférieure F de l'image; la partie inférieure C, dans la partie supérieure E*.

Cela posé; 1°. Je laisse couler 193. une boule de B en C. En descendant d'elle-même sur le Plan AD, elle paroîtra monter dans l'image, puisque B doit paroître en F, & C en E.

2°. S'il y a un trou en B, & un trou en C; que la boule descende par le trou C sur une espèce de

508 XIII. ENTRETEN

support , qui par le moyen d'un ressort la remette en B ; le jeu sera continu.

PROPOSITION XIV.

211. Dans le Miroir plan, l'image sera semblable & égale à l'objet.

Fig. 85. De chaque point d, e, f , de l'objet , tirez sur le Miroir AB une perpendiculaire dD, eE, fF , prolongée & double de la distance $d1, e2, f3$, de l'objet au Miroir.

Chacune de ces perpendiculaires est une Cathète d'incidence

* N. partie d'un point de l'objet* : donc
293. le point d doit paroître au point

* N. D ; e en E ; f en F* : donc tous
298. les points de l'image paroîtront

aussi éloignés du Miroir , & les uns des autres , que les points de l'objet : donc l'image sera semblable & égale à l'objet.

212. EUDOXE. Par la même raison , ce semble , ce qui est à droite

droite dans l'objet , doit paroître à gauche dans l'image du Miroir plan.

Car chaque point *d* ou *f* paroît-^{Fig. 85.} fant dans un point *D* ou *F* de la Cathete d'incidence*, ce qui est à * *N.* droite paroîtra vis-à-vis de ce qui ^{211.} est à droite ; ce qui est à gauche , vis-à-vis de ce qui est à gauche.

Or ce qui est dans l'image vis-à-vis de la droite de l'objet , paroît à gauche dans l'image ; & ce qui se trouve vis-à-vis de la gauche , paroît à droite. Si l'on se regarde dans un Miroir plan, le bras droit paroît le bras gauche dans l'image ; & le bras gauche paroît le bras droit.

Mais croyez - vous , Ariste , qu'un seul Miroir de Verre puisse multiplier l'objet ?

ARISTE. Oui.

PROPOSITION XV.

²¹³ *Un seul Miroir de verre peut multiplier l'objet.*

Tome III.

S

Fig. 86. Soient A, l'objet; B, l'œil; CD, la Surface extérieure du Miroir; FG la Surface intérieure & étamée; AI, Cathete d'incidence; $CH = AC$, $AF = IF : AD$, AG, rayons d'incidence.

Je dis que l'objet A paroîtra en H & en I, & par conséquent multiplié.


L'angle d'incidence $ADC \angle AKC$ extérieur (a) = AGF (b) : donc l'angle de réflexion $BDL \angle BGM$. Donc les rayons réfléchis DB, GB, feront un angle en B.


Or par le rayon BD prolongé directement en H, l'œil B verra l'objet A en H; & par le rayon BG prolongé en I, l'œil B verra l'objet en I* : donc l'objet A paroîtra en H & en I (c).

(a) Géométrie, N. 129.

(b) Ibid. N. 104.

(c) Par le même principe, un Miroir épais regardé obliquement peut représenter





EUDOXE. La seconde image I ^{Fig. 2.} doit être plus sensible, parce que le Vif-argent qui est plus dense que le Verre, réfléchira plus de rayons.

Pour le Miroir cassé, sans doute il multipliera l'objet entre vos mains.

ARISTE. Pas toujours.

PROPOSITION XVI.

214. *Le Miroir cassé multipliera l'objet, quand les fragmens AB, BC, ne seront point dans le même Plan, c'est-à-dire, lorsqu'ils feront un angle.* ^{Fig. 87.}

Soient D, l'objet; E, l'œil; DA, DF, deux Cathetes d'incidence tirées de l'objet D sur les deux fragmens AB, BC, faisant l'angle ABC; AG prolongement

plus de deux images du même objet. Une partie du rayon GB réfléchi par le point P en M, & par le point M en N fera voir l'objet A au-dessous du point L.

Sij

$= DA$, $DB = BH$, je dis que D fera multiplié.

Le rayon EI réfléchi par AB fera voir l'objet D en G; le rayon FE réfléchi par BC fera voir l'objet D en H*. Or un objet qui paroît en même temps en divers endroits, est multiplié: donc D le fera.

PROPOSITION XVI.

Fig. 28: 215. *Mais si les fragmens MO, ON, sont dans le même Plan, ou qu'ils ne fassent pas un angle; le Miroir cassé MN ne multipliera point l'objet P à raison de la fracture.*

Dans cette hypothèse, il n'y aura qu'une Cathète d'incidence, ou qu'une perpendiculaire PM tirée de l'objet sur le plan (a).

Soit le prolongement $MR = PM$.

Les Triangles MIP, MIR feront égaux, ainsi que les Triangles

(a) Géométrie, N. 303.

MOP, MOR *: donc les rayons * N. réfléchis ne feront voir l'objet P 197. qu'en R *: or l'objet qui ne paroît * N. 93. en même temps que dans un endroit, n'est pas multiplié : donc le Miroir cassé MN ne multipliera point l'objet P, à raison de la fracture.

EUDOXE. En un mot les parties de ce Miroir ne faisant qu'un Plan, il représentera l'objet dans un point seul de la Cathète, comme le Miroir plan.

216. Enfin, Ariste, il faut multiplier le même objet à l'infini par deux Miroirs plans.

ARISTE. Soient donc AB, CD Fig. 89. deux Miroirs paralleles; E, l'objet; F, l'œil; GH perpendiculaire à AB & par conséquent à CD (a); CI = EC; AL = AE; CK = CL; CH = CM, &c.

Je dis que le Miroir CD fera voir l'objet E en I par une seule

(a) Géométrie, N. 46.

214 XIII. ENTRETEN

réflexion ; en K , par une double ;
en H par une triple , &c.

1°. Par une réflexion seule , le
Miroir CD fera voir l'objet E à
l'œil F dans la Cathète d'inciden-
ce EI autant au-delà du Miroir

* N. qu'il est en deçà* : or $CI = CE$
298. par la construction : donc par une
réflexion seule , le Miroir CD fe-
ra voir l'objet en I.

2°. Après deux réflexions , l'une
en S , l'autre en O , le Miroir CD
fera voir l'objet E , comme s'il

* N. étoit en L* : or si l'objet E étoit
299. en L , le Miroir CD le feroit voir

* N. à l'œil F en K* , puisque $CK =$
300. CL. Donc par une double réflé-
xion , l'objet E doit paroître en K.

3°. Après trois réflexions en R ,
Q , P , le Miroir CD fera voir l'ob-
jet E comme s'il étoit en M* : or
si l'objet E étoit en M , le Miroir
CD le feroit voir en H ; car CH
 $= CM$:

Donc par une triple réflexion

SUR LA CATOPTRIQUE. 215
l'objet E paroîtra en H, &c.

Comme il y a dans chacun des Miroirs une infinité de points qui peuvent causer une infinité de réflexions, l'image de l'objet peut-être toujours plus éloignée : mais comme la lumière diminue toujours à force de réflexions, les images de l'objet deviennent insensibles.

EUDOXE. Aussi, qu'un Lustre soit suspendu entre deux glaces dans un Salon : les réflexions simples, doubles, triples, &c. feront paroître le Lustre, simple, double, triple, &c. plus éloigné à proportion, & moins éclatant.

ARISTE. Vous voyez ces Miroirs sphériques, Eudoxe.

EUDOXE. Nous les verrons de plus près au premier jour.



XIV. ENTRETEN.

Sur les Miroirs sphériques convexes.

EUDOXE. **D**E grace , Ariste ;
rappelez-moi en
Propositions suivies mes idées sur
les Miroirs sphériques convexes.

ARISTE. Voici mes idées là-
dessus ; feront-elles les vôtres ?

PROPOSITION I.

217. *Sur le Miroir sphérique ;
l'angle de réflexion est égal à l'angle
d'incidence.*

Soit ABC , grand cercle du
Fig. 90. Miroir ; BD , demi-diamètre de
ce cercle ; HI , Tangente per-
pendiculaire à ce diamètre ; BH
= BI :

Je dis que l'angle de réflexion
LBC est égal à l'angle d'inciden-
ce KBA.

1°. L'angle rectiligne $\text{LBI} = \text{KBH}$ *.

* N.

2°. L'angle mixte $\text{CBI} = \text{ABH}$: car les côtés BI, BH étant égaux, le côté BD commun, & les angles compris droits, les Triangles BID, BHD , sont égaux (a) : ainsi l'angle $\text{BDC} = \text{BDA}$, & l'arc $\text{BC} = \text{BA}$.

D'ailleurs, le rayon $\text{DC} = \text{DA}$, & par conséquent $\text{CI} = \text{AH}$, puisque $\text{DI} = \text{DH}$.

Donc l'angle $\text{CBI} = \text{ABH}$:

Cela posé; l'angle LBC est formé de deux angles, égaux, pris ensemble, aux deux angles qui forment l'angle KBA : donc l'angle $\text{LBC} = \text{KBA}$.

Ainsi le rayon oblique KB , ne revient pas sur lui-même.

PROPOSITION II.

218. La ligne DBM tirée du centre D par le point B de réflexion

Fig. 90.

(a) Géométrie, N. 136.

Tome III.

T

*divise par le milieu l'angle KBL
fait par le rayon d'incidence KB
& le rayon réfléchi BL.*

Je dis que l'angle $MBL = MBK$.

L'angle droit MBH fait par le prolongement MB du rayon DB, & par la Tangente HI, est égal à l'angle droit MBI (a): & l'angle de réflexion LBI est égal à l'angle d'incidence KBH: or des angles droits égaux MBI, MBH, ôtez les angles égaux LBI, KBH: reste l'angle $MBL = MBK$ (b); donc l'angle $MBL = MBK$.

PROPOSITION III.

Fig. 90: 219. *La Cathète d'incidence KP
étant réfléchie, reviendrait sur elle-
même.*

C'est une perpendiculaire sur
* N. le Miroir ABC *: donc n'ayant
193. aucune direction pour aller à

(a) Géométrie, N. 10.

(b) Ibid.

SUR LA CATOPTRIQUE. 219
droite ou à gauche, elle revien-
droit sur elle-même.

PROPOSITION IV.

220. *La Cathète d'incidence KP Fig. 90,
& la Cathète de réflexion LN pro-
longées se rencontreront dans le cen-
tre D du Miroir sphérique.*

Ce sont des lignes perpendicu-
laires sur la surface sphérique*, & * N.
dont les prolongemens PD, ND 192,
sont rayons: or les rayons se ren-
contreront dans le centre (a).

PROPOSITION V.

221. *Le rayon réfléchi DC, Fig. 91,
étant prolongé du côté du Miroir,
doit rencontrer la Cathète d'incidence
AB.*

Soit D le point de réflexion.

1°. Le rayon d'incidence AD,
le rayon réfléchi DC & les Cathé-
tes AB, CB, sont dans le même
Plan*.

(a) Géométrie, N. 18.

* N.
194.

220 XIV. ENTRETEN

2°. Faisons dans ce Plan l'angle $BCE = ABC$; donc CE & AB seront parallèles (a), les angles alternes B & BCE étant égaux.

Ainsi, DC qui rencontre CE parallèle à AB , n'est parallèle à CE (b), ni à AB (c) : donc DC prolongée vers le Miroir doit faire quelque angle avec AD ou rencontrer AB , sçavoir en F .

EUDOXE. Par la même raison, le rayon d'incidence AB rencontrera la Cathète de réflexion CB .

ARISTE. Sçavoir en G .

PROPOSITION VI.

Fig. 92: 222. Si les yeux A, B, se trouvent dans différents Plans du Miroir, ayant même axe, ou une section commune CD, l'image de l'objet paroîtra dans la rencontre C de la Ca-

(a) Géométrie, N. 102.

(b) Ibid. N. 40.

(c) Ibid. N. 47.

thète d'incidence DC & des rayons réfléchis.

1°. L'image paroîtra dans l'endroit où les rayons AEC, BFC réfléchis aux yeux d'une part & prolongés de l'autre, se rencontreront, c'est-à-dire, dans le sommet du Cône lumineux formé par ces rayons*.

* N 93.

2°. Ces rayons réfléchis par les *tranchants des Plans qui se couperont, étant prolongés dans le Miroir même, se rencontreront dans la commune section de ces Plans: or cette commune section est la Cathète d'incidence DC**, puisque c'est une perpendiculaire qui *part de l'objet D & passe par le centre C: donc l'image paroîtra dans la rencontre de la Cathète d'incidence & du rayon réfléchi (a).*

* N 93.

* N.

219.

(a) Si les deux yeux se trouvoient dans le même Plan, les prolongemens des rayons réfléchis se rencontreroient un peu avant la Cathète d'incidence: mais la distance étant petite, on la compte pour rien.

PROPOSITION VII:

Fig 93. 223. Dans le Miroir sphérique convexe, si l'angle au centre A formé par la Cathète d'incidence AB & la Cathète d'inclinaison AC est double de l'angle d'incidence; l'image D est à la surface du Miroir.

Soient l'angle d'incidence BE-

* N. $X = FEZ$ angle de réflexion * ;
 217. l'angle $CEB = CEF$, puisque la Cathète d'inclinaison CEA divise


* N. l'angle BEF par le milieu *.
 218.


Je dis que l'image D se trouve à la surface du Miroir.

1°. La somme des angles du Triangle DEA, est égale à la somme des angles BEX, FEZ, CEB, CEF (a).

2°. L'angle A, double de l'angle BEX, vaut $BEX + FEZ = BEX$; & l'angle $AED = CEF$ opposé au sommet; donc l'angle $ADE = CEB = CEF = AED$:

(a) Géométrie, N. 95, 122.





Donc l'angle $ADE = AED$:
 donc le Triangle DEA est isocèle : donc $AD = AE$, demi-diamètre (*b*) : donc le prolongement ED du rayon réfléchi FE aboutit à la surface ; & par conséquent l'image D paroît à la surface du Miroir *.

* N,

222.

PROPOSITION VIII.

224. Si l'angle au centre A , formé par la Cathète d'incidence AB & par la Cathète d'inclinaison CA est moindre que le double de l'angle d'incidence BGD , l'image H sera en dedans du Miroir. Fig. 244

Par l'hypothèse, l'angle $A < BGD$, angle d'incidence, + EGF , angle de réflexion = BGD * ; & l'angle $AGH = CGE$ * N. opposé au sommet : donc l'angle $GHA > BGC = CGE$ * = AGH : donc l'angle $GHA > AGH$; donc le demi diamètre $AG >$

217.

* N.

218.

(a) Géométrie, N. 127.

224 XIV. ENTRETEN.

AH. Donc le prolongement GH du rayon réfléchi EG, aboutissant en H, l'image H paroîtra en dedans du Miroir.

PROPOSITION IX.

Fig. 95. 225. Enfin, Si l'angle au centre A formé par la Cathète d'incidence AB & la Cathète d'inclinaison CA, est plus grand que le double de l'angle d'incidence $BEF = GEI$; l'image L doit paroître hors du Miroir.

Par l'hypothèse, l'angle $A > BEF$ angle d'incidence + GEI angle de réflexion = BEF ; & l'angle $AEL = CEG$ opposé au sommet: donc l'angle $ALE < CEB = CEG^* = AEL$: donc l'angle $ALE < AEL$: donc le côté $AL > AE$ demi-diamètre: donc EL prolongement du rayon réfléchi GE rencontrera la Cathète d'incidence hors du Miroir: donc l'image L doit paroître hors du Miroir.

* N.
218.

Passerons-nous des Miroirs
sphériques convexes aux Miroirs
sphériques concaves?

EUDOXE. Demain au plus tard.

XV. ENTRETEN.

Sur les Miroirs sphériques concaves.

EUDOXE. **R** Edites-moi donc
encore, Ariste,
ce que ces nouvelles figures vous
disent.

ARISTE. Vous le voulez, Eu-
doxe, c'en est assez. J'appellerai
Foyer du Miroir le point où les
rayons parallèles à l'axe rencon-
treront l'axe même après la réflexion.

PROPOSITION I.

226. Dans un Miroir sphérique
concave, ABC, la ligne tirée du
centre, au point de réflexion B, par-
tage en deux parties égales l'angle Fig. 96.

226 XV. ENTRETEN

FBE formé par le rayon direct FB & le rayon réfléchi BE.

Soit la Tangente GBH : je dis que l'angle $FBD = DBE$.

1°. L'angle $DBG = DBH$, droit ou formé par une Tangente sur un rayon (a).

2°. l'angle $FBG = EBH$; car si un rayon tombe sur un point d'une ligne droite , l'angle de réflexion est égal à l'angle d'inci-

* N. dence *.

194. Or de choses égales DBG ; DBH , ôtez choses égales FBG , EBH ; les restes seront égaux : donc l'angle $FBD = DBE$.

PROPOSITION II.

Fig. 97. 227. Si l'inclinaison du rayon tombé sur un Miroir sphérique concave parallèlement à l'axe , est de 60 degrés , ou que l'angle ABE fait par ce rayon AB avec le demi-diamètre EB soit de 60 degrés ; le rayon réfléchi

(a) Géométrie, N. 79.

BD rencontrera l'axe CD dans le Pole D du Miroir.

1°. Dans l'hypothèse, l'angle ABE est de 60 degrés : donc l'angle EBD est de 60 degrés *.

* N.

2°. AB étant parallèle à CD, ^{226.} l'angle BED alterne est aussi de 60 degrés (a).

Donc l'angle BDE est de 60 degrés (b); ainsi $ED = EB$, demi-diamètre; & par conséquent le point D, où le rayon réfléchi BD rencontre l'axe CD, est dans la surface; & c'est le Pole du Miroir.

PROPOSITION III.

228. Si l'inclinaison d'un rayon ^{Fig. 27.} FG parallèle à l'axe CD, est au-dessous de 60 degrés; le rayon réfléchi GH rencontrera l'axe CD du Miroir à une distance du Miroir.

(a) Géométrie, N. 101.

(b) Ibid. N. 122.

228 X V. ENTRETIEN.

moindre que la quatrième partie du diamètre.

Je dis donc que HD est moindre que la moitié du demi-diamètre ED.

* N. L'angle $FGE = EGH$ *; &
226. l'angle $FGE = GEH$ alterne (a).
Donc l'angle $EGH = GEH$:
donc le côté $EH = GH$.

Or $GH > HD$, Sécante qui passeroit par le centre E (b): donc $HD < EH$: donc HD est moindre que la moitié du demi-diamètre.

PROPOSITION IV.

Fig. 97. 229. *La distance HE du centre E au point H où le rayon FG parallèle à l'axe CD, rencontrera l'axe après la réflexion, est à la moitié EI du demi-diamètre EG, comme le Sinus total au Sinus du complément de l'inclinaison.*

(a) Géométrie, N. 101.

(b) Ibid. N. 76.

1°. $HG = HE^*$: donc si l'on ^{* N₂} abaisse la perpendiculaire HI, EI ^{228.}
 $= \frac{1}{2} GE$ (a).

2°. Si l'on prend HE pour Sinus total, EI fera Sinus de l'angle EHI (b), complément de l'angle HEI = EGF, angle d'inclinaison (c) : donc la distance HE est à la moitié EI du demi-diamètre, comme le Sinus total au Sinus du complément de l'inclinaison.

EUDOXE. Aussi HE est au Sinus total, ou de l'angle droit opposé HIE, comme EI au Sinus du complément EHI (d) : donc en raison alterne, HE. EI :: Sinus total, Sinus du complément (e); & par conséquent Sinus du complément de l'inclinaison. Sinus total :: EI. HE.

(a) Géométrie, N. 136.

(b) Trigonométrie, N. 11.

(c) Géométrie, N. 139.

(d) Trigonométrie, N. 59.

(e) Calcul Littéral, N. 137.

230 XV. ENTRETEN

230. Analogie qui vous donnera, ce semble, une manière de trouver dans un Miroir sphérique concave la raison que la distance HD du foyer H où se réunissent après la réflexion les rayons parallèles à l'axe, doit avoir au demi-diamètre.

ARISTE. Je dirai : comme le Sinus du complément de l'inclinaison est au Sinus total, ainsi la moitié EI du demi-diamètre à la distance HE du Foyer H au centre E; & HE me donnera HD avec le rapport de HD au demi-diamètre.

Fig. 97. EUDOXE. Pour moi, je tirerai sur le rayon EG une Tangente GL parallèle à la perpendiculaire HI, & prolongerai ED en L; EG sera Sinus total; EL sécante de l'angle GED. Les angles en G & en I seront droits (a), & l'angle HEI, commun; ainsi les Triangles GLE, IHE seront équiangles.

(a) Géométrie, N. 95.

gles (a). Je dirai donc : EH. EL
 :: EI. EG (b) : or EI est moitié de
 EG, Sinus total * : donc EH est * N₂
 moitié de EL, Sécante de l'an-²²⁹
 gle GED.

Enfin, connoissant la Sécante
 EL & le demi-diamètre ED avec
 le rapport de EH à la Sécante,
 j'aurai la raison de EH, & par
 conséquent de HD, au demi-dia-
 mètre.

Soit l'angle LEG d'un degré :
 donc la Sécante EL = 100014
 ou 15, ce semble (c) : donc EH
 = 50007 : donc puisque ED =
 100000 (d), EH excède HD de 14
 cents millièmes : donc HD sera
 au demi-diamètre ED, comme
 50000 — 7 à 100000.

Mais quelle sera la raison de la
 force de la lumière dans le Foyer

(a) Géométrie, N. 133.

(b) Ibid N. 150.

(c) Trigonométrie, N. 58.

(d) Ibid. N. 6.

232 X V. ENTRETIEN

à la force de la lumière dans chaque point de la surface réfléchissante ?

231. *ARISTE.* La force de la lumière dans le Foyer doit être à la force de la lumière dans chaque point du Miroir, comme l'étendue de ce Miroir à celle du Foyer, puisque la force dans le Foyer est composée de toutes les forces réfléchies par les points du Miroir.

De-là, comme les rayons du Soleil tombent parallèlement sur
 N.33. la surface convexe du Miroir,
 est-il étonnant qu'ils aient assez de force pour brûler & fondre ?

PROPOSITION V.

Fig. 98. 232. Si l'on place un corps lumineux dans le Foyer G d'un Miroir sphérique concave, les rayons réfléchis BH, DI, seront parallèles.

Soient GB, rayon d'incidence;
 EB, demi-diamètre : donc l'angle d'inclinaison $EBG = EBH^*$.
 * N. 226. Cela

Cela posé ; 1°. Le rayon réfléchi BH sera parallèle à l'axe EC : car si HB étoit rayon d'incidence parallèle à l'axe EC, BG seroit rayon réfléchi *, puisque l'angle ^{* N,} EBG = EBH : donc par la même ^{226.} raison, GB étant rayon d'incidence dans l'hypothèse, HB ou BH parallèle à EC sera rayon réfléchi.

2°. Par la même raison encore, DI sera parallèle à EC : or deux grandeurs parallèles à une troisième sont parallèles entre-elles (a).

Donc les rayons réfléchis BH, DI seront parallèles.

EUDOXE. De-là, si le corps lumineux est au Foyer G du Miroir concave, les rayons réfléchis parallèlement BH, DI, porteront la lumière très-loin, un petit Flambeau placé dans le Foyer, donnant quelquefois assez de lumière pour lire à cent pas.

(a) Géométrie, N. 47.

234 XV. ENTRETEN

ARISTE. Et si ces rayons sont reçus par un second Miroir de même espèce : ils se réuniront de nouveau & brûleront au Foyer de ce second Miroir (a).

PROPOSITION VI.

Fig. 99. 233. Mais si l'on place le corps lumineux F entre le Miroir concave BDK & le Foyer A, les rayons réfléchis s'écarteront.

Soient GB ligne tirée du centre, ou demi-diamètre ; FB, rayon d'incidence : je dis que le rayon réfléchi sera, non BC, parallèle à l'axe DE, mais BH, qui s'en écarte.

1°. Si le corps lumineux étoit

(a) Zahnius dit qu'à Viennes deux Miroirs concaves de cuivre, l'un de 6 pieds, l'autre de 3, allumoient par réflexion à 20 ou 24 pieds une chandelle, dont la mèche étoit enduite de Soufre. On mettoit des charbons ardents dans le Foyer du plus grand ; le lumignon de la chandelle étoit au Foyer du plus petit.

SUR LA CATOPTRIQUE. 235
 au Foyer A, non en F, le rayon
 réfléchi seroit BC parallèle à l'a-
 xe *.

* N.

2°. Mais le corps lumineux^{232.}
 étant en F, l'angle d'inclinaison
 GBF formé par le demi-diamètre
 GB & le rayon d'incidence FB
 est plus grand que l'angle GBA :
 donc l'angle de réflexion sera plus
 grand que l'angle GBC = GB-
 A* : donc le rayon réfléchi sera
 non BC, mais BH.

* N.

226.

EUDOXE. En un mot : l'angle
 GBF > GBA = GBC* : donc
 l'angle GBH = GBF* > GBC.

* N.

226.

* Ibid.

ARISTE. Plaçons maintenant le
 corps lumineux entre le Foyer &
 le centre.

Fig. 99.

PROPOSITION VII.

234. Si le corps lumineux I se
 trouve entre le Foyer A & le centre
 G, les rayons réfléchis se réuniront
 dans l'axe DE au-delà du centre G.

Fig. 99.

Soient IK, rayon d'incidence ;

Vij

236 X V. ENTRETIE N.

KE, rayon réfléchi; GK demi-diamètre. Je dis que le rayon réfléchi KE rencontrera l'axe DE au-delà de G.

1°. Si le corps lumineux étoit au Foyer A, le rayon réfléchi

* N. KL seroit parallèle à l'axe DE*.

232. 2°. Mais l'angle d'inclinaison GKI fait par le demi-diamètre GK & le rayon d'incidence IK, est plus petit que l'angle GKA

* N. = GKL* : donc par la même raison, l'angle GKE < GKL : donc KE rencontrera l'axe faisant l'angle alterne KEG = EKL (a).

3°. Le point de rencontre E est au-delà de G, puisque l'angle * N. GKE = GKI*.

226. De-là, 1°. Si le rayon EK part d'un point E de l'axe au-delà du centre G, le rayon réfléchi KI, rencontrera l'axe entre le Foyer A & le centre G.

2°. Si l'on met une Bougie en

(a) Géométrie, N. 122.

SUR LA CATOPTRIQUE. 237
I, l'image paroît en E.

PROPOSITION VIII.

235. *L'image de l'objet C placé entre le Foyer B & le centre D paroîtra devant le Miroir, & plus éloignée du Miroir que le centre D, par exemple, en E.* Fig.
100.

Soient les demi-diamètres DG, DH : l'image doit paroître aux yeux I, K, dans le point où les rayons réfléchis & la Cathète d'incidence se rencontrent*. Or ils se ^{*N. 93:} rencontreront au point E* : donc ^{& 222.} l'image paroîtra devant le centre ^{* N.} même du Miroir en E. ^{234.}

PROPOSITION IX.

236. *Enfin, plus l'objet qui se trouve entre le centre & le Foyer, est proche du Foyer, plus l'image sera éloignée du Miroir.*





Soit l'objet A plus proche du Foyer B, que l'objet C, en sorte Fig.
100. que A & C se trouvent entre le

238 XV. ENTRETIEN

Foyer B & le centre D : l'image de l'objet C étant supposée en E, je dis que celle de l'objet A doit paroître au-delà du point E, par exemple en F.

L'angle d'inclinaison $DGA > DGC$: donc l'angle correspondant $DGF > DGE^*$: donc les
 * N.
 226. rayons partis de l'objet A se réuniront en F au-delà de E : donc l'objet A paroîtra en F.

De-là , si vous portez prestement vers le Foyer du Miroir concave , la pointe d'une épée, la pointe de l'épée semble revenir sur vous avec la même vitesse, approcher de votre sein d'autant plus près , qu'elle s'en éloigne davantage ; & si vous étiez moins Mathématicien , peut-être seriez-vous allarmé d'un danger qui fuit & qui n'est qu'illusion. Lors même que l'on connoît l'illusion, l'on a peine à se rassurer. On sçait qu'il n'y a rien à craindre & l'on



26

C
H
B

crain ; mais crainte mêlée de plaisir , sur tout quand l'on connoît le jeu des rayons qui la causent.

Mais , Eudoxe , nous avons parlé si souvent des rayons lumineux : ne dirons nous pas un mot de l'Ombre ?

EUDOXE. Je compte bien que l'Ombre sera, du moins, la matière d'un Entretien.

XVI. ENTRETIEN.

Sur l'Ombre.

ARISTE. **V**oilà quelques essais sur l'Ombre. Voudriez-vous , Eudoxe , les lire & les examiner ? Peut-être que dans la lecture & dans l'examen , vous verriez mieux ma pensée.

EUDOXE. Très-volontiers ; Ariste , voyons-les , ces essais.

237. L'Ombre est une priva-

240 XVI. ENTRETEN.

tion de lumière causée par un corps opaque. Si la privation de lumière est entière, c'est *Ombre pure*, *Ombre totale* (a); sinon c'est *Ombre partielle*, *Pénombre*.

PROPOSITION I.

238. *L'Ombre se répand en lignes droites.*

Les rayons lumineux qui rasent le corps opaque, se répandent en
N. 10. lignes droites.

Donc l'Ombre qui est une privation de lumière causée par le
*N. corps opaque interposé entre ces
227. rayons*, se répand en lignes droites.

PROPOSITION II.

239. *L'Ombre se répand vers*

(a) On ne voit pas l'Ombre pure: car dans l'Ombre pure, point de lumière: or on ne voit pas sans lumière. Quand on dit que l'on voit une Ombre, on ne voit qu'une diminution de lumière, ou des corps faiblement éclairés par des rayons réfléchis.

l'endroit

Pendrait directement opposé à la lumière.

L'interposition du corps opaque empêche la lumière de se répandre vers cet endroit : donc l'Ombre s'y répand *.

* N.

240. De-là, 1°. Le corps opaque A jette autant d'Ombres différentes qu'il y a de corps lumineux qui l'éclairent ; A , qui prive l'espace B de la lumière E , & l'espace C de la lumière D * produit deux Ombres , B , C.

237.

Fig.
101.

* N.

239.

2°. L'Ombre A qui est plus proche du corps opaque , est plus obscure que l'Ombre B plus éloignée , parce que les rayons collatéraux CT , GF , qui viennent à se rompre dans les vapeurs ou par la rencontre de l'air * , vont plus tôt en B qu'en A , qui demande une réfraction plus grande , & par conséquent plus difficile.

Fig.

102.

* N. 461

41.

3°. La lumière DTK qui rase l'Ombre principale HFTD , n'est

Fig.

102.

242 X V I. ENTRETEN.

proprement qu'une sorte de Pénombre, étant privée des rayons qui viennent d'une partie EI du corps lumineux.

PROPOSITION III.

241. Si une Sphère lumineuse
Fig. CEIG, se trouve égale à une Sphé-
ro2. re opaque TAF, l'Ombre sensible se-
ra figurée en Cylindre.

1°. Les rayons CTD, GFH perpendiculaires & tangents sur les extrémités du diamètre CG, le sont sur les extrémités du diamètre FT égal & parallèle à CG (a).

Donc HF, TD, feront un rectangle d'Ombre (b).

Or ce rectangle, faites le tourner sur son axe; & vous aurez un Cylindre d'Ombre, qui sera l'Ombre jettée par la Sphère opaque.

De-là, 1°. Cette Ombre cylindrique s'étendra jusques à l'endroit où la lumière du corps lumineux

(a) Géométrie, N. 46.

(b) Ibid. N. 170.

pourroit s'étendre ; puisque le corps opaque privera toute cette étendue des rayons interceptés.

2°. Si l'on coupe cette Ombre par un Plan perpendiculaire à son axe , la section sera égale au cercle de la Sphère opaque (a)

PROPOSITION IV.

242. L'Ombre DEI d'un corps sphérique DGI plus petit que la Sphère lumineuse CFH, va en diminuant. Fig: 103.

Je dis que l'Ombre DEI fera un cône , qui aura sa base dans le corps opaque.

Dans l'hypothèse , le rayon DB $\ll$ AC parallèle : donc la Tangente commune CDE va joindre l'axe en E , faisant l'angle BDE droit , & par conséquent BED aigu (b) , = BEI. Ainsi , tirant la corde DRI , parallèle

(a) Géométrie , N. 336.

(b) Ibid. 79. 122.

244 XVI. ENTRETIEN

à CTH, l'on aura le Triangle d'Ombre DRE, rectangle en R(a).

Or faites tourner le Triangle DRE : vous aurez un cône d'Ombre DEI, qui fera l'Ombre jetée par le corps sphérique.

De-là, 1°. Si l'on coupe cette Ombre par un Plan parallele à la base, la section est un cercle (b).

2°. L'Ombre d'un corps opaque éclairé par un corps lumineux plus grand, finit en pointe.

3°. L'Ombre d'un corps sphérique plus grand qu'un corps lumineux qui l'éclaire, croît en forme de cône tronqué.

Fig. 203. Car soient A le corps sphérique plus grand ; B le corps lumineux.

Puisque la Tangente commune CDE rencontre en E l'axe AE, elle s'en écarte en CX : de-là, le Trapeze d'Ombre croissant CTYX

(a) Géométrie, N. 46.

(b) Ibid. N. 369.

qui tournant autour de l'axe EY, décrira un segment de cône, ou une sorte de cône tronqué.

PROBLÈME I.

243. Connoissant le demi-diamètre AC d'une Sphère lumineuse, & le demi-diamètre BD d'une Sphère opaque plus petite, avec la distance AB des centres; trouver la longueur RE de l'Ombre, ou de l'axe du cône d'Ombre. Fig.
103.

Soit PB parallèle à CD: donc $BD = PC$ (a): donc PA est la différence des demi-diamètres AC & BD; & connoissant AC & BD, j'en connois la différence PA.

Cela posé; à cause des Triangles semblables, APB, BDE (b), je dis: comme la différence des rayons est à la distance des centres; ainsi le rayon de la Sphère opaque plus petite, est à la distan-

(a) Géométrie, N. 40.

(b) Ibid, N. 133.

246 XVI. ENTRETEN

ce du centre de cette Sphère à la pointe de l'Ombre.

En un mot, $PA. AB :: BD. BE$ (a); ainsi je connois la distance BE du centre de la Sphère opaque au sommet de l'Ombre.

Et si la raison de BR à RE est insensible, BE sera l'axe de l'Ombre.

Si la grandeur BR doit être sensible, je la cherche de la sorte : je prens d'abord l'arc GS , en disant; AB est à PA comme le Sinus total est au Sinus de l'angle $ABP = GBS$ (b); puis ajoutant l'arc GS au quart de cercle SD , je connois l'arc DR , supplément, & mesure de l'angle DBR . Ainsi connoissant l'angle DBR & l'angle droit R , avec le demi-diamètre BD , je connois BR (c).

Enfin de BE , je retranche BR ;

(a) Géométrie, N. 150.

(b) Trigonométrie, N. 61.

(c) Ibid. N. 64.

& je connois RE axe de l'Ombre.

PROPOSITION V.

244. Si la distance AB du corps lumineux A au corps opaque B diminue, la longueur BE de l'Ombre diminuera à proportion. Fig. 103.

A cause des Triangles semblables, BE. BD :: AB. PA *: donc si AB diminue, ou contient moins de fois PA, BE contiendra moins de fois BD, ou diminuera à proportion. * N. 243.

245. Hauteur apparente d'un corps lumineux, du Soleil, par exemple, est l'arc compris entre ce corps & l'horison, ou l'angle dont cet arc est la mesure.

PROBLÈME II.

246. Connoissant la hauteur AB d'un corps opaque & la hauteur apparente du Soleil ou l'angle ACB formé par le rayon AC parti du cen-

ire de l'Astre, & l'horison BC; trouver la longueur de l'Ombre BC sur le Plan de l'horison.

Dans le Triangle ABC rectangle en B, je connois l'angle ACB avec le côté AB, par l'hypothèse : ainsi la Trigonométrie me donnera le côté BC (a), en disant : si le Sinus de l'angle ACB donne tant de pieds ou de toises pour le côté AB, combien le Sinus de l'angle BAC pour le côté BC ?

De-là, si la hauteur du Soleil; ou l'angle ACB est de 45 degrés, la longueur de l'Ombre BC sera égale à la hauteur AB du corps opaque : car l'angle en B étant droit, si l'angle ACB est de 45 degrés, l'angle BAC sera de 45 degrés aussi (b) : donc $BC = AB$ (c).

(a) Trigonométrie, N. 65.

(b) Géométrie, N. 121.

(c) Ibid. N. 127.

PROBLÈME III.

247. Connoissant la hauteur d'un corps opaque avec la longueur de l'Ombre, trouver la hauteur du Soleil au-dessus de l'horison, ou l'angle qui exprime la hauteur apparente de l'Astre.

Soient AB, hauteur du corps opaque; BC, longueur de l'Ombre; B, angle droit: il s'agit de trouver la valeur de l'angle ACB. Fig²
104.

Si l'on prend BC pour rayon ou Sinus total, AB sera Tangente de l'angle ACB (a): je dis donc, comme la longueur BC de l'Ombre est à la hauteur AB du corps opaque, ainsi le Sinus total est à la Tangente de l'angle ACB; & je connois cet angle puisque je connois la Tangente qui le caractérise (b).

(a) Trigonométrie, N. 7.

(b) Ibid. N. 65.

PROPOSITION VI.

248. *Si les Ombres de deux corps paralleles entre eux & perpendiculaires à l'horifon font terminées par le même rayon ; les longueurs de ces Ombres feront proportionnelles aux hauteurs des corps opaques.*

Fig. 205. Soient AD & BE, corps opaques, paralleles & perpendiculaires à l'horifon ; AC & BC, longueurs des Ombres terminées par le rayon DEC.

Je dis que $AC. BC :: AD. BE.$

Les angles A & B font droits (a), & l'angle C commun : donc, les deux Triangles ACD, BCE étant semblables (b), $AC. BC :: AD. BE$ (c).

Si les rayons DC, ce font différents, mais faifant mêmes an-

(a) Géométrie, N. 95.

(b) Ibid. N. 133.

(c) Ibid. N. 150.

gles ; ce fera la même chose par la même raison.

PROPOSITION VII.

249- Si deux corps opaques sont parallèles entre eux, & inclinés à l'horison, & que les Ombres soient terminées par le même rayon, les longueurs des Ombres seront encore entr'elles comme les hauteurs des corps opaques.

Soient AD & BE, corps opaques, également inclinés; AC & ^{Fig^a} 106. BC, longueurs des Ombres terminées par le rayon DEC :

Je dis que AC. BC :: AD. BE.

Les angles DAC, EBC, sont égaux (a), & l'angle C commun : donc AC. BC :: AD. BE (b).

PROBLÈME IV.

250. Mesurer la hauteur d'une ^{Fig^a} Tour AD par le moyen de l'Ombre ^{105.}

(a) Géométrie, N. 104.

(b) Ibid. N. 150.

252 XVI. ENTRETIEN

qu'elle jette sur un Plan horisontal.

1°. Je fiche en terre dans l'Ombre même un bâton BE dont l'extrémité supérieure E soit rasée par le rayon DEC qui termine l'Ombre.

2°. Je prens la longueur CB de l'Ombre depuis la pointe C jusqu'au bâton BE, & la longueur CA de l'Ombre jusqu'à la Tour AD, avec la hauteur perpendiculaire BE du bâton.

Enfin, comme les Triangles BCE, ACD sont semblables (a); je dis $BC.AC :: BE.AD$ (b); & le quatrième terme de la proportion est la hauteur AD de la Tour (c).

Soit $BC=3$ pieds; $AC=150$; $BE=6$: donc $AD=300$:

Car $3.150 :: 6.300$, puisque

(a) Géométrie, N. 133.

(b) Ibid. N. 150.

(c) Calcul Littéral, N. 137.

$$\frac{150 \times 6 = 900}{3} = 300.$$

On peut planter le bâton *be* Fig³
à l'extrémité C de l'Ombre de la ^{105.}
Tour AD : les rayons DEC, Dec
partis du même point du Soleil,
étant sensiblement parallèles *, ^{*N. 331}
la différence des angles C, c, sera
insensible : ainsi les Triangles
bce, ACD, seront semblables (a);
& par cette analogie, *bc. AC*
:: *be. AD*, l'on aura la hauteur
de AD.

PROBLÈME V.

251. Trouver la hauteur d'un Fig³
corps opaque AD par le moyen de ^{107.}
l'Ombre jettée, partie sur un Plan
horizontal AB, partie sur un Plan
vertical BC.

1°. Ayant mesuré l'Ombre ho-
rizontale AB, je prens avec un bâ-
ton la hauteur de l'Ombre vertical-
le BC.

(a) Géométrie, N. 133.

254 XVI. ENTRETEN

2°. Je plante en terre le bâton ; enforte que la partie qui est hors de la terre , soit égale à la hauteur de l'Ombre verticale ; & je mesure la longueur de l'Ombre jetée par le bâton.

Enfin le rayon DC qui termine l'Ombre , doit passer par l'extrémité supérieure du bâton égal à l'Ombre verticale BC ; donc l'Ombre du bâton ajoutée à l'Ombre horisontale AB , doit faire l'Ombre totale du corps opaque.

Cela posé ; je dis : comme la longueur de l'Ombre du bâton est à la longueur de l'Ombre totale , ainsi la hauteur de l'Ombre verticale BC , égale à la hauteur du bâton , est à la hauteur AD du corps opaque ; & le quatrième terme est AD.

PROPOSITION VI.

Fig. 252. Les longueurs AE, CF, des
 208. Ombres de deux corps opaques AB,

CD, égaux & perpendiculaires à l'horison, sont entre elles, comme les distances EG, FG de leurs extrémités au corps lumineux.

Je dis donc que $AE. CF :: GE. GF$. Les Triangles ABE, GHE, sont semblables (a), puisque les angles BAE, HGE sont droits à cause des perpendiculaires AB, HG (b), & que l'angle E est commun. Par la même raison, les Triangles CDF, GHF, sont semblables; & $AB = CD$, dans l'hypothèse.

Ainsi $AE. GE :: AB. GH$; & $CF. GF :: CD = AB. GH$:

Or deux raisons égales à une troisième, sont égales entre elles (c):

Donc $AE. GE :: CF. GF$; donc en raison alterne, $AE. CF :: GE. GF$ (d).

(a) Géométrie, N. 133.

(b) Ibid. N. 95.

(c) Calcul Littéral, N. 104.

(d) Ibid. N. 144.

256 XVI. ENTRETIEN

De-là, l'Ombre augmente ou diminue à proportion que le corps lumineux est plus ou moins éloigné du corps opaque.

253. *Ombre droite*, est celle qu'un corps perpendiculaire à l'horison jette sur un Plan horifontal, telle est l'Ombre d'un homme. *Ombre verse*, est celle qu'un corps attaché perpendiculairement à un Plan perpendiculaire à l'horison, jette sur ce Plan; telle est l'Ombre d'un stîle fiché perpendiculairement dans une muraille perpendiculaire à l'horison.

PROPOSITION. VII.

254. *L'Ombre droite est à la hauteur du corps opaque, comme le Sinus du complément de la hauteur est au Sinus droit.*

Fig. Soient FDG, quart de cercle;
 209. FA perpendiculaire sur AG (a);
 BC corps opaque perpendiculai-
 (a) Géométrie, N. 91.

re à l'horison AG; AB, longueur de l'Ombre droite jettée par BC*, * N, & terminée par le rayon DCA; ^{254.} DH, Sinus droit de l'arc DG ou de l'angle DAG, hauteur du corps lumineux*, & par consé- * N, quent perpendiculaire sur AH, & ^{102.} parallele à BC, ou AF (a); FD, complément de DG; DE, Sinus du complément & par conséquent perpendiculaire sur AF (b). DE & AH, perpendiculaires entre deux paralleles sont égales (c).

Cela posé, je dis que AB. BC :: DE. DH.

A cause des angles droits B & H & de l'angle commun A, les Triangles ACB, ADH, sont semblables (d) : donc AB. BC :: AH. DH.

(a) Trigonométrie, N. 2. 5.

(b) Géométrie, N. 79.

(c) Ibid. N. 40.

(d) Ibid. N. 133.

258 XVI. ENTRETEN

Or $AH = DE$: donc $AB. BC$
 $:: DE. DH$.

PROPOSITION VIII.

255. Enfin , la hauteur du corps lumineux supposée la même , le corps opaque est à l'Ombre verse qu'il jette , comme l'Ombre droite au corps opaque qui la jette.

Fig. 710. Soient AC longueur de l'Ombre verse du corps opaque AB ; & DE longueur de l'Ombre droite du corps opaque CE .

Je dis que $AB. AC :: DE. CE$.

Les angles opposés au sommet C sont égaux ; & les angles A, E ,
 * N. faits par des perpendiculaires * ,
 252. sont droits : donc les Triangles ACB, ECD sont semblables (a) , & par conséquent $AB. AC :: DE. CE$ (b).

(a) Géométrie , N. 133.

(b) Ibid. N. 150.

PROBLÈME VI.

256. *Mesurer la circonférence de la Terre, comme Eratostenes.*

1°. Je suppose deux rayons tirés du centre du Soleil à deux endroits de la Terre & physiquement parallèles *. B est le premier de ces endroits, Sienne, par exemple; & D, l'autre, savoir, Alexandrie, deux endroits dans le même Méridien. Le Soleil A est au Zenith de B le jour du Solstice, le fond des Puis y étant éclairé. Donc le rayon AB est perpendiculaire à l'horison. Fig. 111.
N. 334

2°. J'éleve le Stile vertical EF; le rayon CD parallèle à AB fait avec le Stile EF, l'angle d'Ombre DFE alterne de BGE, & par conséquent l'angle $BGE = DFE$ (a).

Ainsi, connoissant l'angle D-

(a) Géométrie, N. 101.

FE, je connois l'angle BGE, ou l'arc BE.

3°. Je prens en toises l'arc BE de tant de degrés ; & faisant une règle de trois , je dis : si tant de degrés donnent tant de toises pour la distance de B à D , combien 360 degrés en donneront-ils pour la circonférence de la Terre supposée ronde ? Le quatrième terme de la proportion fera cette circonférence (a).

Vos idées , Ariste , dans ces Essais , aussi-bien que dans les Entretiens qui les ont précédés , me paroissent justes & intéressantes.

ARISTE. Enfin , je demande encore un Entretien ou deux , du moins pour la Perspective.

EUDOXE. Un sujet bien moins important & moins curieux , Ariste , suffiroit pour m'attirer dans votre Cabinet.

(a) Calcul Littéral, N. 137.

XVII. ENTRETIEN.

Sur la Perspective en général.

257. EUDOXE. **L**A Perspecti-
ve, c'est, ce
me semble, l'art de faire un Ta-
bleau, qui, vû d'un certain point,
représente un objet tel qu'il pa-
roît à une certaine distance. Mais,
Ariste, cet art comprend bien
des petits mystères que vous dé-
voilerez en détail.

ARISTE. Ce que ces figures me
diront, Eudoxe, je le redirai pré-
cisément.

258. D'abord le Tableau AB, Fig. 112
je le suppose comme l'on fait d'or-
dinaire, entre l'œil C & l'objet
DE dans une situation perpendi-
culaire à l'horison ; & je regarde
ce Tableau comme un plan trans-
parent, formé par la section des

rayons qui viennent de l'objet à l'œil : si l'on coupoit en A, B, perpendiculairement à l'horison les rayons DAC, EBC, & que la section AB envoyât à l'œil C les rayons AC, BC, comme ils y sont dirigés, on verroit l'objet tel qui paroît en ED*, puisqu'on
 * N. 103. la verroit sous le même angle ; car l'angle $ACB = DCE$ (a).

Fig. 113. Que les rayons partis du Triangle ABC traversent le Tableau DE : ils y traceront le Triangle FGH ; car la base ABC de la Pyramide optique étant un Triangle, FGH sera un Plan Triangulaire (b) ; & ce Triangle FGH feroit sur l'œil I la même impression que le Triangle ABC vû
 * N. 103. sous mêmes angles*.

103. Or le secret de trouver dans le Tableau les points F, G, H, qui feroient sur l'œil I la même im-

(a) Géométrie, N. 93.

(b) Ibid. N. 353.

pression que l'objet ABC, c'est le secret général de la perspective.

EUDOXE. Ainsi les parties plus grandes de l'objet total auront dans le Tableau AB de plus grandes images, des traits plus grands, puisqu'à même distance, les objets plus grands paroissent plus grands *.

Commençons par dessiner un objet total.

259. *ARISTE.* Hé bien, 1°. Avec des fils tendus, les uns verticaux, les autres horisontaux, je fais plusieurs petits quarrés dans un grand AB (a), devant lequel je place une sorte de Pinnule C, ou une lame percée, parallele au quarré AB.

2°. Je fais sur un Plan, par exemple, sur une Toile, autant de petits quarrés qu'il y en a dans le grand AB.

3°. Ayant mis le grand quarré

(a) C'est une sorte de quarré de réduction.

264 XVII. ENTRETEN

AB devant l'objet, j'observe par la Pinnule ou par le trou de la lame percée, chaque partie de l'objet correspondante à chaque petit quarré du grand AB; je la trace dans un petit quarré correspondant de la Toile; & c'est l'objet dessiné.


Avant que d'entrer dans un plus grand détail, pour m'expliquer, je définis quelques termes.


DÉFINITIONS.

Fig. 260. *Plan géométral* KL, est un Plan parallele à l'horison & plus bas que l'œil. On suppose l'objet sur ce Plan, & le Tableau perpendiculaire à ce Plan.

261. *Plan horisontal*, est une surface plane qui coupe l'œil parallelement à l'horison & perpendiculairement au Tableau.

Fig. 262. *Ligne de terre*, ou base du Tableau est la commune section
tion





tion DM du Tableau & du Plan géométral.

263. *Ligne de distance*, ou rayon principal AB est une ligne droite tirée de l'œil perpendiculairement au Tableau CE. Fig. 115.

264. *Point de l'œil, point principal, ou point de vue* B, est le point où le rayon principal AB coupe le Tableau. Fig. 115.

265. *Ligne horizontale* DBE est une ligne qui passe par le point principal B parallèlement à l'horison & perpendiculairement à la ligne de distance AB ; c'est la commune section du Plan horizontal & du Tableau. Fig. 115.

266. *Point de distance* E, ou D ; est un point de la ligne horizontale aussi éloigné du point principal B que l'œil A. Fig. 115.

267. *Hauteur de l'œil*, est la perpendiculaire AF abaissée de l'œil au plan géométral GH. Fig. 115.

268. *Point objectif, ligne objec-*

266 XVII. ENTRETEN.

tive, Plan objectif, &c. est un point, une ligne ou un Plan dont l'apparence doit se trouver dans le Tableau.

Fig. 269. *Représentation, apparence,*
 216. *projection* d'un point, est le point D où le Tableau coupe le rayon optique parti du point objectif. *Projection* d'une ligne, est la commune section DE du Tableau & du Triangle optique BCF parti des points de la ligne objective.

Ainsi, projection d'un Plan ou d'un Solide fera la section représentative de l'un ou de l'autre.

270. *Ichnographie*, est la représentation d'un Plan formé sur le Plan géométral par les lignes droites tirées de tous les points de l'objet perpendiculairement à ce Plan; telle est la projection d'un cercle qu'un Cilindre droit décrit sur un Plan géométral.

271. *Scenographie*, est la projection de la face d'un objet éle-

SUR LA PERSPECTIVE. 267
vé sur ce Plan. L'apparence de
l'épaisseur est le *profil*.

PROPOSITION I.

272. *La projection d'une ligne droite objective est une ligne droite.*

Je dis que DE, projection de la ligne droite BC *, est une ligne droite. Fig. 116.
* N. 268.

DE est la commune section du Tableau & du Triangle optique & rectiligne BCF qui est un Plan (a) : or la commune section de deux Plans est une ligne droite (b).

De-là, 1°. Ayant la projection des deux extrémités B, C, d'une ligne, on a la projection de la ligne BC.

2°. Ayant la projection F, G, H des trois sommets d'un Triangle ABC, on a celle du Triangle. Fig. 113.

(a) Géométrie, N. 92.

(b) Ibid. N. 302.

PROPOSITION II.

*Fig. 273. La hauteur AB d'un point
117. A représenté dans le Tableau, est à
la hauteur EF de l'œil E, comme la
distance GB de l'objet G au Tableau,
est à cette distance GB jointe à la di-
stance BF de l'œil, ou de sa hauteur,
au Tableau.*

Je dis donc que $AB. EF :: GB. GB + BF.$

** N. 258. AB est perpendiculaire à la li-
gne de Terre CBD*, comme
EF au Plan géométral : ainsi AB
& EF sont parallèles (a) : donc les
angles en F & B étant droits (b) &
l'angle en G commun, les Trian-
gles AGB, EGF sont semblables
(c) : donc $AB. EF :: GB. GB +$
 BF (d).*


Voulez-vous maintenant, Eu


(a) Géométrie, N. 44.

(b) Ibid. N. 95.

(c) Ibid. N. 133.

(d) Ibid. N. 150.





doxe , qu'à la lumière de l'Ichnographie , nous tracions un Plan objectif ?

EUDOXE. Nous le tracerons dès ce soir.

XVIII. ENTRETIEN.

Sur l'Ichnographie.

274. *EUDOXE.* **D**'Abord , Aristote, je demande que vous déterminiez dans le Tableau le point qui doit répondre à un point donné de l'objet ou du Plan horizontal qu'il faut trouver.

ARISTE. Soit le point donné A. *Fig: 118.*

1°. Du point A , je tire une perpendiculaire AB sur la ligne de terre CD*.

2°. Sur la ligne de terre CD , ** N^e 262.*
je prens BE = AB.

3°. Ayant la hauteur FG de
Z iij

270 XVIII. ENTRETEN

l'œil F, je cherche le point prin-

* N. cipal H*.

264. 4°. Sur l'horizontale, je prens IH égale à la distance GN de l'œil.

5°. Du point B, je tire au point principal H une ligne droite BH, & une autre EI du point E au point

* N. de distance I*.

266. Et je dis que la section K est la projection du point A, ou le point qui dans le Tableau CP répond au point A de l'objet.

* N. 1°. IH est parallèle à CD*:
265. donc l'angle $\text{EIH} = \text{IEB}$ alterne (a). D'ailleurs, les angles au sommet K sont égaux: ainsi les Triangles IKH, BKE sont semblables (b).

2°. Soit la perpendiculaire LN sur les parallèles IH & BE: donc $\text{IH. BE} :: \text{LK. KN}$, les bases des Triangles semblables étant comme leurs hauteurs, ou les apothé-

(a) Géométrie, N. 101.

(b) Ibid. N. 133.

mes (a); & par conséquent $IH + BE$. $BE :: LK + KN$. KN (b).

Mais par la construction, $BE = AB$, $IH = GN$, & $LK + KN = FG$ * : donc $GN + AB$. ** N.
 $AB :: FG$. KN . 263 & 267.

Donc KN . $FG :: AB$. $AB + GN$ (c) : donc la hauteur KN du point K est à la hauteur FG de l'œil G , comme la distance AB du point donné A de l'objet au Tableau est à cette distance AB jointe à la distance GN de l'œil au Tableau : donc le point K est la projection, l'apparence, ou la représentation du point donné A *. * N.

275. EUDOXE. Mais, Ariste, 732.
 s'il falloit tracer une figure rectiligne dans un Tableau.....

ARISTE. Je prendrois le sommet de chaque angle * : & ayant les sommets des angles, j'au- 274. * N.

(a) Géométrie, N. 254.

(b) Calcul Littéral, N. 144.

(c) Ibid.

* N. rois les figures rectilignes*.

272. EUDOXE. Et comme on a de la même manière dans le Tableau les points d'une ligne courbe , & par conséquent la courbe , vous aurez de même dans le Tableau la projection Ichnographique des figures curvilignes.

276. Mais je voudrois la projection d'un Triangle dont la base fût parallèle à la ligne de terre.

ARISTE. Vous l'aurez , Eudoxe

Fig. 119. Soient le Triangle BDC parallèle à la ligne de terre NF , parallèle à l'horizontale GH ; & l'intervalle IK égal à la hauteur de l'œil : il faut tracer dans le Tableau un Triangle *bcd* représentatif du Triangle BCD.

1°. Ayant pris le point principal I , je prens de I en H la distance de l'œil.

2°. Des sommets B , C , D , du Triangle objectif BCD , je tire les

perpendiculaires BL, DK, CM, sur la ligne de terre NF.

3°. Des points de rencontre L, K, M, je porte sur NF, les perpendiculaires $BL = LE$, $DK = KN$, $CM = MO$.

4°. Après avoir tiré des extrémités L, K, M, des lignes droites LI, KI, MI, au point principal I, je mene des points N, E, O, de la ligne de terre NF, des lignes droites NH, EH, OH, au point de distance H.

Cela posé; les points de section b, c, d , sont les points représentatifs des points B, C, D*: ainsi, * N. tirant les lignes bc, bd, cd , j'au-274. rai le Triangle bcd représentatif du Triangle BCD*. * N.

277. Est-il question de dessiner 272. un quarré ABCD dont la diagonale BD soit perpendiculaire à la li- Fig. 120. gne de terre EF?

1°. Je prolonge les côtés AD, DC, jusques à la ligne de terre

274 XVIII. ENTRETEN
EF; & tire les perpendiculaires
AK, DB, CL.

Fig. 2°. Du point principal G, ou
220. du point de vûe, je mene & en
H & en I une ligne égale à la di-
stance de l'œil, puis les lignes
GB, GK, GL.

Enfin des points H, I, je tire
les lignes droites HB, HF, &
IB, IE.

Et je dis que le quadrilatere
mnop est la projection du quarré
ABCD.

1°. Les angles BAD, BCD
sont droits, le côté $AB = AD$,
& $BC = CD$ (a): donc les angles
ABD, CBD sont de 45 degrés;
chacun (b), aussi-bien que les an-
gles ABE, CBF, la perpendi-
culaire BD faisant les angles DB-
E, DBF droits (c). Donc à cause
des angles droits EAB, FCB, les
angles AEB, CFB sont aussi de

(a) Géométrie, N. 171.

(b) Ibid. N. 181.

(c) Ibid. N. 25.

45 degrés. Et par conséquent $EA = AB$, & $CF = BC$ (a).

2°. Ainsi, prolongeant les côtés $DA = AB$ en E, & $DC = BC$ en F, c'est comme si l'on portoit la perpendiculaire BD de B en E & en F sur la ligne de terre EF, puisque $BD = BE = BF$ (b), les Triangles semblables qui ont un côté égal & les angles sur ce côté égaux, étant égaux.

3°. Des points A, C, l'on a tiré les perpendiculaires AK, CL sur la ligne de terre EF : donc les angles BAK, BCL sont de 45 degrés (c) : donc $AK = KE = KB$, & $CL = LF = BL$ (d), ainsi les perpendiculaires AK & CL portées de K & de L sur la ligne de terre EF, feroient terminées par E, F.

Cela posé, le point de section

(a) Géométrie, N. 137.

(b) Ibid.

(c) Ibid. N. 122.

(d) Ibid. N. 127.

276 XVIII. ENTRETEN

m représente le point A du quarré ABCD ; le point *o*, le point C ; le point *n*, le point D ; le

* N. point *p*, le point B *. Et par conséquent le quadrilatere *mnop* est la figure représentative du quarré

* N. ABCD *.

272. 278. EUDOXE. Mais, Ariste ;
Fig. il s'agit de représenter un pavé EF-
21. DR quarré & composé de quarrés égaux & placés en lignes droites.

ARISTE. 1°. Soit le côté EF sur la ligne de terre, divisé en autant de parties égales qu'il y a de quarraux dans une ligne.

2°. De chaque division, je tire une ligne droite au point principal I.

3°. Je prens les points de distances G, H.

4°. De ces points je mene les lignes droites HF, GE.

5°. Je tire de EI en FI des lignes qui coupent les lignes HF, GE aux points où elles sont cou-

pées elles-mêmes par les lignes EI, FI; & je dis que le trapeze EMNF sera la projection du pavé EFDR.

1°. $EF = FD$, & FD est perpendiculaire sur EF , côté du même rectangle (a). Donc si l'on porte FD , de F sur la ligne de terre EF , D tombera sur E ; ainsi, les lignes IF & GE se coupant en N , N sera la projection du point D *.

2°. Par la même raison, M ^{* N, 274,} sera le point représentatif du point R ; & MN de RD *.

Or on peut dire la même chose du reste, ou des autres points ^{* N, 272.} & des autres lignes par la même raison.

Donc $EFMN$ sera la projection du pavé $EFDR$.

EUDOXE. De la projection d'un rectangle, venons à celle du cercle.

(a) Géométrie, N. 171.

278 XVIII. ENTRETEN

ARISTE. Je commence par deux Propositions.

PROPOSITION I.

279. *Si un cercle étoit parallèle & opposé directement au Tableau, la figure dans le Tableau seroit circulaire.*

Le cercle enverroit à l'œil un
 * N. 72. cône de lumière *, dont l'axe seroit perpendiculaire au cercle, & coupé perpendiculairement par le
 * N. Tableau *: ainsi la section représentative seroit un cercle, puisque
 258. la section d'un cône faite parallèlement à la base & perpendiculairement à l'axe est un cercle (a): donc la figure dans le Tableau seroit circulaire.

PROPOSITION II.

280. *Si l'œil placé hors de la distance du demi-diamètre, voit le cercle obliquement au travers du Tableau; la figure représentative sera un cercle allongé.*

(a) Géométrie, N. 369.

La base du cône optique sera un cercle allongé sensiblement* : * N₁
 donc la section commune du cône-167.
 ne & du Tableau, étant parallèle à la base, sera figurée de même : donc la figure représentative sera un cercle allongé.

281. Faut-il enfin représenter un cercle ?

1°. Ayant circonscrit au cercle un quarré PQTV (a), & tiré deux Fig.
 diagonales PV, QT, avec deux diamètres AB, CD, qui se coupent 122.
 à angles droits, je mene les droites EF, GH, parallèles à CD.

2°. Par les points G, E, & H, F, je tire des lignes droites GEK, HFL, qui sont perpendiculaires sur la ligne de terre MN.

3°. Après avoir tiré au point principal O les droites PO, KO, LO, QO ; & aux points de distance R, S, les droites PR, QS ; je détermine dans le Ta-

(a) Géométrie, N. 244.

280 XVIII. ENTRETIEN

bleau MSRN la projection, l'apparence, ou la représentation du quarré inscrit GEFH, & du quar-

* N. ré circonscrit PQTV *.

278. 4°. Par les points de section *bgceAfdh* du Tableau, je décris les arcs *bg*, *gc*, *ce*, &c. & la courbe *bgceAf*, &c. est la projection du cercle.

Car les points de section *b*, *g*, *c*, *e*, &c. sont les points qui dans le Tableau répondent aux points

* N. *b*, *g*, *c*, *e*, &c. du cercle * : donc
278. les arcs *bg*, *gc*, *ce*, &c. qui joignent ces points, font la figure représentative du cercle placé horizontalement dans le Plan.

Quand tracerons-nous la surface d'un objet élevé sur ce Plan?

EUDOXE. Au retour d'une petite promenade qui pourra servir à ranimer l'attention.

XIX. ENTRETIEN.

Sur la Scenographie.

EUDOXE. IL s'agit donc , Aristote, de la Scenographie , c'est-à-dire , du secret de tracer la surface d'un objet élevé sur le Plan géométral.

ARISTE. Commençons par démontrer une Proposition qui répandra le jour dans quelques Problèmes.

282. *La hauteur de l'objet est à celle de sa projection, comme la distance de l'objet au Tableau plus la distance de l'œil est à la distance de l'œil.*

Soient AB, hauteur de l'objet ; ^{Fig.} CD, sa projection ; BF, distance ^{123,} de l'objet au Tableau ; FG, distance de l'œil E.

Supposons la hauteur AB op;

Tome III.

Aa

282 XIX. ENTRETIEN

posée directement à l'œil, enforte que $BF + FG$ ou BG soit perpendiculaire à la ligne de terre HI .

Je dis que $AB. CD :: BG. FG$.

1°. DF & EG étant perpendiculaires sur BG , & par conséquent parallèles (a); $BF. FG :: BD. DE$ (b): donc $BF + FG$, ou $BG. FG :: BD + DE$, ou $BE. DE$ (c). Donc $BG. FG :: BE. DE$ (d).

2°. AB est perpendiculaire sur BG & par conséquent parallèle à CD , ou CD , perpendiculaire aussi sur BG . Donc à cause des Triangles semblables AEB, CED ; $AB. CD :: BE. DE$ (e).

Or deux raisons égales à une troisième sont égales entr'elles (f).
Donc $AB. CD :: BG. FG$.

(a) Géométrie, N. 44.

(b) Ibid. N. 150.

(c) Calcul Littéral, N. 144.

(d) Ibid. N. 104.

(e) Géométrie, N. 150.

(f) Calcul Littéral, N. 104.

Supposons maintenant que la hauteur KL de l'objet est oblique à l'œil E, en sorte que LG coupe obliquement le Tableau en M, tandis que BG le coupe perpendiculairement. Fig.
124.

1°. KL. NP :: LG. MG ; de même que AB. CD :: BG. FG, & par la même raison. Fig.
124. &
123.

2°. Tirez la perpendiculaire LQ sur la ligne de terre IH : LQ fera la distance de la hauteur KL au Tableau (a), comme FG la distance de l'œil. Fig.
124.

Et je dis KL. NP :: LQ + FG. FG.

A cause des angles opposés au sommet en M & des angles droits en Q, F, les Triangles LQM, MFG sont semblables (b) : donc LQ. FG :: LM. MG (c) : donc

(a) Géométrie, N. 34.

(b) Ibid. N. 133.

(c) Calcul Littéral, N. 150.

284 XIX. ENTRETIEN

$LQ + FG. FG :: LM + MG ;$
ou $LG. MG.$

Or $KL. NP :: LG. MG : \text{donc}$
 $KL. NP :: LQ + FG. FG (a).$

Cela supposé ;

PROBLÈME I.

283. *Sur un point donné dans le Tableau, élever la perspective correspondante à l'objet.*

Fig. 125. Soit A , le point donné dans le Tableau IG.

1°. Sur la ligne de terre GC, j'éleve la perpendiculaire BC égale à la hauteur de l'objet.

2°. Des extrémités B & C de la perpendiculaire BC, je tire à un point quelconque E de la ligne horizontale IK deux lignes droites BE, CE.

3°. Du point donné A, je mène une ligne droite AF parallèle à la ligne de terre GC, & qui rencontre CE en F.

(a) Calcul Littéral, N. 104.

4°. Du point F , j'éleve sur AF la perpendiculaire FH.

Enfin , ayant pris sur IK la distance LK de l'œil , & la distance LI de l'objet au Tableau , je tire la droite CK & sur CK j'abaisse LM parallele à IC ; & je dis que $AP = FH$ élevée sur le point A est la hauteur représentative de BC* , ou que $BC. FH$ ^{* N₄} $282.$ $:: IK. LK.$

1°. A cause des Triangles semblables IKC , LKM ; $IK. LK :: CK. MK$ (a) ; & à cause des paralleles FM & EK ; $CK. MK :: CE. FE$; & par conséquent $IK. LK :: CE. FE.$

2°. A cause des paralleles BC & FH & des Triangles semblables BEC , & HEF ; $BC. FH :: CE. FE$ (b).

Donc $BC. FH :: IK. LK$ (c). *

(a) Calcul Littéral, N. 150.

(b) Ibid.

(c) Ibid, N. 104.

PROBLÈME II.


284. *Représenter un solide élevé sur sa base.*

- * N. 1°. Je prens le Plan de la base *.
 274. 2°. Sur chaque point de la base ;
 je trace la hauteur correspondant
 * N. te à celle de l'objet * ; & c'est
 283. l'apparence du solide élevé sur sa
 base.



Faut-il élever un Cylindre ?

- 1°. Je trace le cercle , qui en
 * N. est la base *.
 281. 2°. Sur les points *b, g, c, e* ;
 Fig. A, f, & c. du cercle tracé , j'éleve
 222. des lignes qui répondent à autant
 * N. de lignes de l'objet *.
 283. Enfin , joignant les extrémités
 supérieures par des lignes comme
 j'ai joint les extrémités inférieu-
 res *b, g, c, e, A, f, & c.* j'ai la sur-
 face représentative du Cylindre
 élevé.

285. EUDOXE. Mais , Aristote ;
 il est question d'élever une Pyra-
 mide.



119




121



122





ARISTE. C'est-à-dire, Eudoxe, qu'il faut dessiner une Pyramide élevée sur sa base. Hé bien, soit ^{Fig^a} la Pyramide de quatre côtés AB-^{126.}CDE élevée sur un quarré & vûe par un angle.

1°. Je trace le quarré de la base*. * M.

2°. Je tire dans ce quarré deux ^{277.}diagonales qui se coupent en F.

3°. D'un point G pris à volonté dans la ligne de terre IK, j'éleve une ligne GL, égale à la hauteur de la Pyramide donnée; & des deux extrémités GL de cette ligne GL, je mene deux lignes droites GM, LM, à un point quelconque M de l'horizontale NO.

Enfin, après avoir prolongé la diagonale BD jusques à la ligne GM, qu'elle rencontre en P, je tire du point P la ligne PQ parallèle à GL.

Et je dis que PQ élevée sur F,

288 XIX. ENTRETEN.

milieu de BD , fera l'axe & donnera le sommet E de la Pyramide , & par conséquent les côtés.

* N. 1°. BDP est parallele à la ligne
276. de terre IK * , dont les points B , D , sont également éloignés ;

* N. ainsi PQ sera la hauteur apparen-
283. te de GL * : donc $PQ = FE$, étant élevée sur F , fera l'axe représentatif ; & le point E fera le sommet de la Pyramide.

2°. Des angles A , B , C , D , de la base, tirez des lignes droites au sommet E : & vous avez les côtés AE , BE , DE , &c. de la Pyramide apparente.

286. EUDOXE. Ainsi , pour avoir un Cône en perspective ,
* N. l'on pourra tracer d'abord le cer-
281. cle qui en est la base * , puis prendre la hauteur apparente du
* N. Cône comme celle de la Pyra-
285. mide * , tirer des lignes droites du cercle représentatif au sommet,
&

les joindre par des lignes courbes *.

* N.

287. Mais , Ariste , il s'agit ^{277.}
d'élever au-dessus du pavé, des Mu-
railles , des Pilastres , des Colon-
nes.

ARISTE. 1°. Je trace dans le ^{Fig. 127.}
Tableau le pavé ABCD *.

* N.

2°. Je porte sur la ligne de ^{278.}
terre l'épaisseur AE , DF , de la
Muraille.

3°. Des points A , E , D , F ,
j'éleve des perpendiculaires AG .
EH , DI , FK.

4°. Ayant joint les points G ,
I , je joins le point principal O
par les droites IO , GO.

5°. De B & C , j'éleve les per-
pendiculaires BL , CM.

Et voilà les Murailles ABLG ,
DCMI , tracées.

Enfin , pour élever des Pilastres
& des Colonnes , je trace d'a-
bord leurs bases quarrées * ou cir-
culaires *. Puis , j'éleve sur les ^{277.}

* N.

* N.

290 XIX. ENTRETIEN

bases des perpendiculaires indéfinies. Ensuite, sur la ligne de terre EF, j'éleve la hauteur du premier Pilastre ou de la première Colonne DI; & tirant la droite IO, comme auparavant, je détermine les hauteurs représentatives des autres Pilastres ou des autres Colonnes.




Fig. 288. Faut-il dessiner une Porte dans une Muraille ABLG?

227.

1°. Je marque sur la ligne de terre la distance AN de la Porte au coin A, avec la largeur des poteaux NP, QR, & la largeur PQ de la Porte.

2°. Des points N, P, Q, R, je mène au point de distance S des lignes droites NS, PS, QS, RS, qui déterminent la largeur représentative yz de la Porte PQ, & la largeur xy ou za des poteaux NP, QR.

3°. De A en T, je trace la hauteur AT de la Porte; & de A



en

rea

po

dr

de

pi

re

a

c

f

i

en V, la hauteur AV des poteaux.

4°. Je joins T & V avec le point principal O, par des lignes droites TO & VO.

Enfin des points x, y, z, a ; de la ligne AB, je mene des lignes paralleles à AG dont les intérieures coupent la droite TO, & les autres, VO; & c'est la Porte tracée.

289. *EUDOXE*. Mais je suppose qu'il est question de représen- Fig:
127.
ter une Porte dans la Muraille apparente BLMC.

ARISTE. On la représentera de même à peu près.

1°. Sur la ligne de terre EF je prens la distance Ab de la Porte au coin A, & la largeur bd de la Porte.

2°. Des points b, d , je tire au point principal O les droites bO, dO; & j'ai la largeur fg de la Porte apparente.

292 XIX. ENTRETIEN.

3°. Des points f, g , j'éleve des perpendiculaires sur BC.

4°. Du point A en T, je porte la hauteur vraie AT.

5°. Du point T, je mene au point principal O la droite TO qui coupe BL en un point.

6°. Je fais ff & gg égales à la partie de BL comprise entre le point B & la droite TO ; & j'ai la porte ff, gg .

290. EUDOXE. On tracera, ce semble, les Fenêtres comme la Porte, marquant leur distance au pavé.

291. Mais, Ariste, Il faut tracer l'Ombre.

ARISTE. Tracer l'Ombre, c'est déterminer le point où aboutissent les rayons qui rasent le corps opaque ; & deux Problèmes suffiront pour faire comprendre ma pensée.

PROBLÈME I.

292. *Ayant l'apparence de la hauteur du corps lumineux, & l'apparence du corps opaque** ; trouver ^{* N^o} le point où les rayons qui rasent le ^{284.} corps opaque, aboutissent, & par conséquent la longueur & la figure représentative de l'Ombre.

Soient AB apparence de la ^{Fig^e} hauteur du corps lumineux ; CD, ^{128.} du corps opaque : par les extrémités des deux lignes AB, CD, je tire les droites ACE, BDE, qui se coupent en E ; & je dis que le point E est le point qu'il falloit trouver, que DE est la longueur de l'Ombre, & que le Triangle DCE est la figure représentative de l'Ombre.

A cause des Triangles semblables ABE, CDE (a), AB. CD ::

(a) Géométrie, N. 133.

294 XIX. ENTRETIEN.

AE. CE :: BE. DE (a) ; donc E est le sommet de l'angle formé par les rayons ou les lignes BE, AE, qui terminent l'Ombre, DE en est la longueur, & CDE la projection.

PROBLÈME II.

293. *Ayant la hauteur perpendiculaire apparente du corps lumineux, & celle d'une Pyramide triangulaire, tracer l'Ombre ou la base de l'Ombre:*

Fig. 29. Soient AB, hauteur perpendiculaire du corps lumineux; FG, celle de la Pyramide CDEF.

1°. Je joins les extrémités inférieures B, G, des deux perpendiculaires par la droite BG prolongée indéfiniment.

2°. Du point A par F, je tire la droite AFH, qui coupe en H le prolongement de BG : donc H sera le terme de l'Ombre.

(a) Géométrie, N. 150.

Enfin, du point H, je mene les droites HE, HD.

Les rayons qui rasent le côté EF sont terminés par HE ; & ceux qui rasent le côté FD, par HD : ainsi le Triangle EHD est la base de l'Ombre. Et c'en est assez pour voir ma pensée.

XX. ENTRETIEN.

Sur les Projections informes.

EUDOXE. **J**E m'en souviens ; Aristé ; il est question de ces images défigurées, qui vûes d'une certaine distance, paroissent belles & naturelles.

294. ARISTE. Voulez-vous, Eudoxe, que je trace d'abord une de ces images sur un Plan ?

1°. Je fais un quarré ABCD à volonté ; & divisant deux côtés AC ^{Fig.} 130.

Bb iiij

AB en parties égales, je réduis le quarré total en petits carreaux; & c'est le chassis du Prototype.

2°. Dans le quarré réduit de la sorte, je trace le Prototype ou l'image qui doit être défigurée.

3°. Je tire la ligne $EF = AC$, & la divise en autant de parties égales.

4°. Du milieu G de la ligne EF, j'abbaisse la perpendiculaire GH, d'autant plus longue que l'image doit être plus allongée, plus difforme; puis sur GH, je mene la perpendiculaire HI.

5°. Ayant tiré en H de chaque division de la ligne EF, une ligne droite EH, PH, QH, FH, je joins les points I, F, par la droite IF.

6°. Par les points de section K, l, m, n, je mene des lignes paralleles à EF; & le Trapezoïde EFKO est le chassis de

l'Esquisse , ou de la copie informe.

Enfin , dans chacun des Trapezoïdes de l'Esquisse , je trace ce qui lui répond dans un des quarrés du Prototype , & j'ai l'image défigurée , qui étant vûe du point I , paroîtra belle & naturelle , parce qu'on la verra sous le même angle , ou à peu près , que dans le Prototype.

EUDOXE. Je sçai qu'un objet plus grand qu'un autre , mais vû plus obliquement , ne laisse pas d'être vû sous le même angle *.

Mais , Ariste , je ne vois pas assez

295. *ARISTE.* Traçons une image défigurée qui d'un certain endroit paroisse régulière sur la surface d'un Cône ; & nous verrons assez le mystère de ces sortes d'illusions ou de ces espèces de jeux magiques.

1°. Autour de l'image qu'il

Fig.

133.

faut défigurer, je décris une circonférence circulaire ABCD, & partage le cercle en secteurs égaux, en huit, par exemple.

2°. Je divise un rayon AE en parties, en trois, & fais passer par chaque division un cercle; & c'est *la claye du Prototype*.

Fig. 3°. Je fais un Triangle rectan-
131. gle FGH, prenant d'abord $FG = AE$, égal au demi-diamètre IK de la base du Cône ILMN-OP; puis $GH = KP$, axe du Cône. Ainsi; l'hypoténuse $FH = IP$, côté du Cône.

4°. Je divise FG en autant de parties égales que $AE = IK$; & ayant pris sur GH prolongé le point 2 pour la distance de l'œil, je tire de ce point aux divisions R, S, des lignes droites qui coupent FH en T, V.

Fig. 5°. Ayant porté sur le côté IP
131. du Cône les segmens HV, VT, qui deviennent PX, XY; je dé-

cris par X, Y, des cercles Xx, Yy, paralleles à la base IMOZ.

6°. Je divise la base du Cône en autant d'arcs égaux que le cercle ABCD ; & tire de chaque division une ligne droite LP, MP, NP, &c. au sommet P du Cône.

Ainsi, la surface du Cône comprend autant de Trapezoïdes que l'image.

7°. Les traits qui se trouvent dans chaque Trapezoïde de l'image, transportez-les dans le Trapezoïde correspondant, mais plus long, du Cône : l'image sera allongée & défigurée sur la surface du Cône.

8°. Prenant sur le prolongement de l'axe KP, la distance $P_4 = H_2 = KP$, pour placer l'œil en 4, je tire les lignes 4X, 4Y, 4x, 4y, qui vont rencontrer IO en 5, 6, 7, 8 : il est clair

que IK se trouve coupée comme FG.

Cela supposé ; je dis que l'œil placé en 4 verra sur la surface du Cône l'image réformée, ou telle qu'elle est dans le cercle ABCD.

Puisque PX répond à HV, & XY à VT, il est clair que IK, aussi-bien que KO est divisée comme FG, & AE, en parties égales.

De-là, si par les points de section 5, 6, 7, 8, l'on décrit des cercles concentriques, & que du centre K, l'on tire les rayons KL, KM, KN, &c. la base du Cône se trouvera divisée en autant de Trapezoïdes, que l'image & la surface du Cône, & ceux de la surface répondront à ceux de la base.

On peut donc supposer que la base du Cône est l'image véritable, comme la surface du Cône est l'image défigurée: or l'œil étant placé

en 4, chaque trait de celle-ci doit paroître égal au trait correspondant de celle-là, PX, par exemple, à K6*, puisque PX & K6 sont vûs * N. sous le même angle $X_4P = 64K$. 103.

296. Voulez-vous une autre manière de défigurer l'image ABCD, & de la rétablir?

1°. Ayant décrit autour de l'image qu'il faut défigurer, une circonférence ABCD, & partagé le cercle en huit secteurs égaux, je divise un rayon en huit parties égales, & décris par chaque division un cercle concentrique.

2°. Prenant un rayon EF, double du diamètre AC du cercle, je forme un quart de cercle EFG, dont je divise l'arc FG en autant de parties égales que la circonférence ABCD.

3°. Je porte GE de E en H, en sorte que $EH = GE$, & de l'intervalle EH, je décris le quart de cercle EI.

4°. Je tire HF, qui étant la diagonale d'un quarré, puisque $EH = GE = EF$, coupe le quart de cercle EI par le milieu L (a).

5°. Je divise EL en autant de parties égales que FG; & par les divisions, je tire des Sécantes qui vont couper EF en M, N, &c.

6°. Du centre E, je décris par les points de rencontre M, N, &c. des arcs concentriques MO, NP, &c. & le cercle ABCD, & le quart de cercle EFG ont même nombre de Trapezoïdes correspondants, dont le premier est au premier, comme le second au second.

7°. Je trace dans le quart EFG l'image du cercle ABCD, en sorte que les traits qui remplissent un Trapezoïde du cercle, remplissent le Trapezoïde correspondant du quart de cercle EFG; & l'i-

(a) Géométrie, N. 181.

image y fera défigurée ; les traits y seront allongés.

8°. J'applique le quart EFG sur une surface conique.

9°. Je suppose l'œil placé dans un point aussi élevé au-dessus du sommet du Cône, que ce sommet est éloigné de la base.

Et je dis que l'image paroîtra sur le Cône égale & semblable à l'image donnée du cercle ABCD.

1°. Le rayon EF étant quadruple de celui du cercle ABCD par la construction, la circonférence dont EF est rayon, doit être quadruple de celle du cercle ABCD (a) : donc l'arc FG vaut la circonférence ABCD. De-là, si l'on applique le quart de cercle EFG, sur un Cône ; FG sera la circonférence de ce Cône, circonférence égale à celle du cercle de l'image régulière ABCD.

2°. Comme les Trapezoïdes

(a) Géométrie, N. 165.




du Cône répondent à ceux du cercle, chaque Trapezoïde du Cône fera vû sous le même angle que le Trapezoïde correspondant du cercle, ainsi que PX paroît sous le même angle que K6 * ; par conséquent l'image paroîtra sur le Cône telle qu'elle est dans le cercle, ou égale & semblable ; & au jugement des sens, les traits défigurés seront rétablis tout d'un coup.

Enfin, Eudoxe, vous avez eu le courage d'entendre dans un assez bon nombre d'Entretiens une partie de ce qui s'est trouvé de mon goût dans des matières seches d'elles-mêmes.


EUDOXE. Ce qui s'est trouvé de votre goût, Ariste, m'a fait plaisir ; & peut-être le liroit-on avec plus d'agrément encore.


Fin du Tome troisième.






132









1243 vol





